

大家好，今天小编来为大家解答宝宝矫正地包天费用是多少这个问题，宝宝矫正地包天费用是多少钱啊很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. [地包天牙齿矫正年龄是多少](#)
2. [宝宝地包天怎么办](#)
3. [宝宝2岁3个月地包天能治好吗](#)
4. [我的宝宝一岁多有点地包天 怎么矫正 多大适合](#)
5. [地包天矫正的最佳年龄](#)

地包天牙齿矫正年龄是多少

地包天矫正不看年龄，一经发现就应该及时治疗。

武汉大学人民医院口腔医学中心主任彭友俭教授表示：“地包天”会严重影响面部以及颌骨的生长发育，如果反牙合得不到及时治疗，会严重影响孩子面部发育。

“地包天”一经发现，应立即矫正。因为早期可通过一些简单的方法来阻止它进一步发展，及时矫正能有效阻断颌骨异常发育；在换牙期，面部生长发育旺盛，反颌如能得到矫正，往往可以起到事半功倍的效果。

当错过了最佳矫治时期，反牙合会越来越严重，面型越来越差，仅凭简单的矫治可能达不到效果，往往要等到成年以后通过“正畸联合正颌外科手术”才能治疗。

扩展资料

出现地包天牙科疾病的患者基本都要佩戴牙套二到三年的时间，当然如果出现口腔牙齿畸形严重的患者，还需要及时进行拔牙以及手术矫正整形，此时患者的恢复时间会继续延长，患者刚开始会不适应，一般2-3周基本能够适应了。

口腔内虽然唾液的分泌能够起到杀菌的效果，但是由于矫正牙套属于外来物质，很容易受到细菌的侵袭，建议大家在饮食过后可以用清水或者是漱口水进行清洁，保持口腔的健康。

参考资料来源：人民网-"地包天"一发现就要及时矫正

参考资料来源：人民网-什么是地包天如何预防和矫正地包天

宝宝地包天怎么办

地包天是牙齿畸形的一种，很多人从婴儿时期就患有地包天，如果在孩子小的时候不能及时的矫正地包天，就会对孩子日后的形象造成很大的影响，所以家长要积极的矫正婴儿地包天，那么，婴儿地包天该如何治疗呢？

婴儿地包天可由于牙齿萌出、替换过程中有局部障碍，如乳前牙早失、乳尖牙磨耗不足等引起；也有的是由于遗传、疾病等因素，如由于扁桃体慢性炎症及肥大，导致呼吸不畅而前伸下颌。

以及婴儿期母亲哺乳姿势不当，奶瓶开口过小等原因使下颌经常前伸所致，还有可能由于某些不良习惯造成，如咬上唇、长期吮指或有些孩子由于好奇而模仿周围有兜齿的人。

预防婴儿地包天的形成是关键，在婴儿生长发育过程中我们要注意以下几个方面，首先在婴儿时期，母亲要掌握正确的哺乳姿势，不能让婴儿平卧自抱奶瓶吸奶。

而对于有咬上颌或下颌前伸不良习惯的幼儿应及早干涉，及早改掉不良习惯，如不能改掉习惯则需要向专业正畸医师求助，可通过一些纠正不良口腔习惯的活动矫治器来解决；有乳前牙滞留或因意外过早失牙情况时，应及时就诊，拔除滞留乳牙，保持早失乳牙间隙等来预防小儿地包天的形成。

如果婴儿地包天已经形成，该如何诊治呢，是否向其他错合畸形一样等待牙齿替换完成后再进行矫治呢！当然不是，婴儿地包天应早期干预。因为长期反合将限制上颌骨的发育，严重者将造成骨性下颌前突，影响面部美观。早期矫治，可收到良好的矫治效果，并可防止畸形继续加重。

婴儿地包天的发病率在逐渐上升，所以很多人都开始关注矫正婴儿地包天的方法，有些家长总觉得孩子年龄还小，所以就不重视婴儿地包天的矫正，却不知道这样是会给孩子的生活带来很多影响的，所以我们要抓住治疗时期及时的治疗婴儿地包天。

宝宝2岁3个月地包天能治好吗

病情分析：

现在宝宝2岁多太小，还不能配合治疗，家长可以在孩子4岁左右的时候，带孩子到口腔科就诊。

指导意见：

到时做矫治器进行矫正，孩子大一点，也可以配合治疗。再就是到时候要看看孩子的牙齿反颌是骨性的还是牙性的，再决定用什么样的保持器进行矫正。

如有疑问追问，

如满意记得采纳，

如果有其他问题也可点我名字向我求助

答题不易，

如果没有回答完全，请您谅解，

请采纳最快回答的正确答案！！谢谢！

我的宝宝一岁多有点地包天 怎么矫正 多大适合

宝宝一般三周岁所有乳牙出齐，咬合关系建立。现在应该乳磨牙没有完全萌出，还不能判定是地包天。建议喂奶时不要压迫宝宝的上颌骨。自己吃奶瓶时，最好采取侧卧位，不要仰卧，避免压迫上颌骨。三岁以后如果出现地包天的情况及时去医院做矫正。

到了年龄可以去口腔正畸科去咨询一下，就可以考虑治疗，不是牙套,但是也是需要戴一个装置,把上牙推出来的，可以先去咨询一下，医生还需要详细的检查一下覆颌覆盖，再制定计划,确定治疗时间,但是这个一般都是越早越好，因为反颌久了,对颌骨的发育影响就越大。

地包天矫正的最佳年龄

孩子的牙齿发育，不仅关系咀嚼消化功能，还会对其面容产生影响。地包天就是牙齿下前牙咬在上前牙的外面，“地包天”不仅影响孩子牙齿发育，还影响整个口腔，面容。那么，地包天矫正的最佳年龄是多少？

地包天矫正的最佳年龄

一般来说，儿童的大多数牙齿畸形要等换完牙，也就是恒牙长齐以后再做矫正，而“地包天”不能等换完牙后再治，需尽早治疗。因为颌骨，也就是牙齿周边骨头的生长，要比身体的发育早。颌骨发育早，所以“地包天”会影响整个口腔、颜面、颌骨的生长发育。那么，地包天矫正的最佳年龄是多少？

第一阶段：2—5岁

乳牙期反颌的治疗阶段是在2—5岁左右，最佳治疗年龄在4岁左右。这时孩子的恒牙还没有萌出，乳牙的牙根也没有吸收，治疗时只需要在医生的指导下，通过戴活动矫治器、改正口腔不良习惯等简单方法矫治；3—6个月即可完成矫治。

第二阶段：6—12岁

这个时间是替牙牙合期，如果出现替牙期反颌，那么治疗时间应该在6—12岁，最佳治疗年龄应为9岁左右。此时仅是牙齿反颌，矫治起来相对较容易。可以根据孩子的反颌情况从轻至重分别采用活动、固定矫治器，甚至配合口外整形力来纠正牙齿。

第三阶段：12岁以后

如果替牙期反颌没有及时矫正，到恒牙期矫正一般是在12岁以后，则需用较复杂的矫治器，矫治难度大、时间长，费用较高，且面型改善不明显，严重者须采取正颌外科手术才能矫正。

如何预防地包天的形成

1、帮助孩子纠正不良习惯。比如有咬上颌或下颌前伸的幼儿应该尽早干涉，让其改掉不良习惯。

2、鼓励母乳喂养。只能人工喂养的儿童吃奶的姿势应为侧卧，不要养成仰面吃奶的习惯。母乳喂养的妈妈要注意纠正不良的哺乳姿势，避免婴儿下颌过度前伸。人工喂养的宝宝，不能让他平卧自抱奶瓶吸奶。

3、尽早去专业口腔科做检查，一旦发现问题就需要进行早期矫治。有乳前牙该掉时不掉或因意外过早掉牙情况时，应及时就诊。

4、在幼儿时期接受，只需要简单的戴矫正器进行矫正就可以了。但是如果拖到成

年还没有进行矫正，那唯一的办法就只能进行手术来进行矫正了。

精彩推荐：

新生儿病理性黄疸

母乳性黄疸怎么办

婴儿感冒怎么办

宝宝长牙的症状

宝宝缺钙的症状

关于宝宝矫正地包天费用是多少和宝宝矫正地包天费用是多少钱啊的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗
？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。