

大家好，关于矫正牙齿的骨钉是什么很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于矫正牙齿的骨钉是什么材料的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. [有龅牙怎么办？](#)
2. [正畸骨钉多久可以取出来](#)
3. [什么是正畸骨钉？](#)
4. [正畸骨钉一般戴多久](#)
5. [骨钉是磨嘴怎么办](#)

有龅牙怎么办？

您好，有龅牙的话是可以进行牙齿矫正的，首先要拍片确定是否是牙源性还是骨源性。如果是牙源性则是可以直接矫正的。骨源性则需要做手术才能矫正好。但是两者都是可以矫正回来的。

正畸骨钉多久可以取出来

正畸骨钉一般3-6个月后会取出来。当颌骨出现严重前突或者牙齿需要移动较长距离时，仅仅利用磨牙支抗很难达到矫正目标，必须在第一磨牙与前磨牙之间的骨皮质内植入种植支抗。支抗钉需要1周左右形成初步愈合，2周后可以悬挂橡皮圈，进行牵引。种植支抗钉结合弓丝的超弹力，可以使牙齿缓慢移动。约3-6个月，完成矫治任务后就可以拆除骨钉。

什么是正畸骨钉？

正畸骨钉，又叫支抗钉。即微种植钉，其由金属材料制作而成，安全可靠。其尺寸根据不同规格，直径为1.0-2.0mm，长度为5-10mm，在正畸临床过程中被广泛使用。当正畸医生需要移动部分牙齿而又不希望其他一些牙齿移动时，往往会采用这种装置。在正畸治疗中，若使用支抗钉对希望移动的牙齿施加正畸力，就可以避免牙齿与牙齿之间对拉时的反作用力。例如，当前牙严重前突畸形的时候，多需要拔牙矫治。

用支抗钉来整体内收前牙，减少后牙向前移动，从而达到解决前牙前突的问题。使用这种装置能大大提高矫治效果及效率。支抗钉的植入操作使用局部麻醉，操作微创，耗时少，不适感小，植入后无特殊注意事项。完成治疗后取出支抗钉，般无明显不适，无需麻醉，1周左右黏膜即愈合。值得注意的是，支抗钉可能会存在松脱的风险，这时需要正畸医生根据情况，更换区域重新植入支抗钉或选择一些其他的方式来进行治疗。

正畸骨钉一般戴多久

牙齿矫正骨钉一般要待一年到两年左右，具体需要根据个人恢复情况决定。

牙齿矫正骨钉属于牙齿矫正的一种矫正方式，是利用将特殊的医用骨钉植入牙槽骨组织，利用牵引、推动原理

骨钉是磨嘴怎么办

骨钉被磨嘴可能是因为把骨钉和磨头不当地拧松了，导致扳手把磨头卡住而使骨钉磨嘴。要解决这个问题，我们可以采取以下几种方法：1、用油润滑骨钉磨头，使其保持光滑，并将其安装牢固；2、用双头扳手将骨钉的头部和磨头的头部拧紧，使其保持牢固，从而防止骨钉被磨嘴；3、如果骨钉已经磨嘴了，可以用一个金属锉将其利边削尖，使其复原，然后再拧紧骨钉，以避免再次磨嘴。上述三种方法可以有效地防止骨钉被磨嘴，当然，为了更好地保护骨钉，也应该定期对骨钉进行检查和维护。

如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。