老铁们，大家好，相信还有很多朋友对于贵州唇系带矫正术多少钱和贵州唇系带矫正术多少钱啊的相关问题不太懂，没关系，今天就由我来为大家分享分享贵州唇系带矫正术多少钱以及贵州唇系带矫正术多少钱啊的问题，文章篇幅可能偏长，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

1. [为什么有很多人带孩子做舌系带手术？](#)
2. [宝宝唇系带磕断了怎么办](#)
3. [唇系带矫正术的方法](#)
4. [一岁半宝宝舌系带轻微短，需要手术吗？](#)
5. [新生儿唇系带低，舌系带短，什么时候剪比较合适？](#)

为什么有很多人带孩子做舌系带手术？

谢邀！

影响与原因

舌系带确实是一个儿童发育期间常遇的问题，舌系带发育异常会带来二个方面的影响：

1、在婴儿哺乳时期，吮奶时，由于舌系带过短，会影响舌的运动，从而影响婴儿的吸吮能力。通常表现为不能将舌前伸超过牙龈，在吸吮时不能很好地包绕乳头形成密封，有时轻微情况可通过调整喂养姿势和方式解决，但如果严重影响哺乳的情况下，须由医生判断。

2、由舌系带指挥牵引着舌头在口腔内配合着其他肌肉、功能器官，在灵活的运动中，才能发出各种平舌音，卷舌音，翘舌音等。如果舌系带过短，会影响舌头在口腔内的活动，影响吐字和发音，尤其对翘舌音、卷舌音、腭音及其他舌音影响较大，如汉语拼音字母中的“C和L” “R”、爷爷的“爷”奶奶的“奶”字音发音不准。

每个人的舌系带都有独特性，并非天生一样，根统计，舌系带过短的患病率大约4.2-10.7%，也有报道不到1%。目前尚未查阅到有对舌系带过短的统一鉴定标准，只是对舌系带过短的病理现象进行分类，如舌系带增厚、舌尖向内凹陷呈心形、舌尖运动受到影响等。这些判断的标准需要儿科或口腔科医生进行诊断。

分歧与意见

但很多儿科、口腔的科专家认为，部分家长带孩子做舌系带手术，有的是对孩子发育的误解，也有的是道听途说产生的担心，更有甚者是来源于周围迷信的误导。

例1、很多家长带着孩子到医院或语言障碍矫正学校都会先入为主，比如问：“是不是孩子的舌头有问题，是不是舌头下面的筋牵着呢？把下面的筋剪一下吧，我们院子的孩子剪过之后，说话就清楚了！”

例2、“大夫，人家都说我家孩子舌筋短，孩子爷爷奶奶说舌筋短的孩子犯忌，是不是应该趁早做手术？”

对于这些内心执着，心情焦虑的父母，完全理解他们此刻的心情。但是千万不能犯一叶障目不知三秋的错误。

应对与分析

一定要清楚一个事实，舌系带并不是语音障碍的唯一病因，语言病理学非常复杂，涉及学科类别非常广泛。语言障碍成因复杂，语言障碍表现类型较多，舌系带短并不是孩子说话不清的唯一原因或主要原因。

舌系带病理鉴定原则

1、舌系带器官的病患异常是什么类型，问题不是很严重。2、舌系带的功能障碍影响有多大。3、孩子产生语言障碍，舌系带是不是唯一原因。4、如果单纯为了语言矫正，术前舌系带的影响有多大，需不要手术。

因此，当发现孩子出现这种情况时，最好能带去医院请专业的医生诊断，一旦确诊为是舌系带过短，并确实，应尽早手术，如果不影响语言康复矫正，也可以不用手术，提前进行矫正。

总之，舌系带的治疗应该遵循个体化的治疗原则，切勿人云亦云，道听途说！

宝宝唇系带磕断了怎么办

你好，首先需要看一下断裂的程度，如果断裂的程度比较严重或者说完全断裂，肯定需要进行缝合，有可能会使上唇外翻，影响这个孩子的嘴型，会使这个孩子吐字不清楚。如果只是部分的断裂，对孩子影响不是特别大，是不需要缝合。当然，平日时候，需要注意孩子的口腔卫生健康等，可以多使用漱口水。

唇系带矫正术的方法

唇系带矫正术的方法主要是在局麻或者是全麻的作用下，将唇系带向上提拉大概1~2厘米左右。它的适用范围主要是纯脐带过低导致前门牙有缝隙，或者是一些老年人因为无法进行镶牙影响到全口义齿就位的问题，都可以采用这种方法来进行矫正，效果是挺好的。

一岁半宝宝舌系带轻微短，需要手术吗？

如果不影响发音的话，可以不剪。影响到发音的话，小孩的说话声和哭声会和正常的小孩有点不同。建议多咨询几家医院，看看医生都怎么说。如没必要就不用做手术了。

新生儿唇系带低，舌系带短，什么时候剪比较合适？

家长特邀回答新生儿舌系带短的问题，家长之所以问这个问题，就是担心将来孩子因为舌系带短，成为人们说的“大舌头”，说话口齿不清、流口水，怎么办？是不是要早点把舌系带剪了，别急，下面我们就回到这个问题，行为家长能够受益。

一、什么是舌系带？

孩子张开口撬起舌头时，在舌和口底之间的一薄条状组织。舌系带的前面是与下颌部中切牙间的舌侧牙龈相连，后面与舌腹相连。正常舌系带可以使舌头活动自如，舌尖能自然地伸出口外，或向上舔到上齿龈。新生儿出生时，舌系带是连在舌尖或接近舌尖的状态。

二、舌系带是怎么随着发育而变化的？

1、舌系带发育：

正常舌系带是位于口腔底部的前方、舌尖下面正中的一种粘膜皱襞。在新生儿时期的舌系带是一直延伸到舌尖或接近舌尖的，随着孩子的发育，舌头也在不断发育，舌系带就会逐渐向舌根退缩。正常小儿2岁以后舌尖才逐渐远离系带。

正常舌系带

2、舌系带过短：

在少数发育不正常情况时才出现舌系带过短。如果舌系带一头附着在舌尖，另一头附着口腔底的前侧，这样就限制住舌头的运动，向外不能伸出口外，向上又舔不到上腭，这就是舌系带过短。

舌系带过短：是指孩子出生后舌系带没有退缩到舌根下，导致舌头不能伸出口外，舌尖不能上翘。

3、舌系带过短的分度：

舌系带的发生率是4%~5%，舌系带过短分为轻度、中度、重度三种。

轻度：孩子伸舌可以到达下嘴唇和下巴之间的位置，但是舌尖受舌系带轻微拉扯，而呈轻微的W形。

中度：孩子的舌头可以伸出嘴唇，但舌尖呈现较明显的W形。

重度：孩子舌头无法伸出嘴唇，进食、发音有明显障碍。

三、如何早期发现孩子舌系带过短呢？

- 1、宝宝从小吃奶无力，舌头总是裹不住奶嘴，容易漏奶。
- 2、宝宝长牙时舌系带容易反复出现小溃疡。
- 3、宝宝伸舌不容易伸出口唇，或伸舌时舌尖呈分叉状，舌尖形状不好看。
- 4、孩子开口讲话总是口齿不清楚。

四、舌系带过短什么时候处理？

家长发现孩子舌系带过短，不要急于求成，应该带孩子到医院去检查，听从医生的意见。

舌系带短在早期不一定就是不正常，孩子不到2岁时，舌系带是不能退缩到舌根的。

最好观察到2岁以后，如果孩子的舌系带确定过短，以致影响舌前伸，妨碍孩子发音，尤其是卷舌音和舌腭音发音不准，这时候就可以剪开了。

只需要将舌系带前端的薄膜剪开，不需要局部麻醉。如果系带发生纤维化，短而粗硬，即舌系带短缩，则要到医院进行手术。

关于贵州唇系带矫正术多少钱，贵州唇系带矫正术多少钱啊的介绍到此结束，希望

对大家有所帮助。