

大家好，今天来为大家解答南京上睑提肌多少钱这个问题的一些问题点，包括做上睑提肌手术多少钱大概也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. [上睑下垂要提肌吗](#)
2. [上眼睑有哪些结构](#)
3. [上眼睑下垂怎么办](#)
4. [上睑下垂做手术后能闭合吗？](#)
5. [先天性上睑下垂原因](#)

上睑下垂要提肌吗

需要根据下垂的程度来进行判断的，如果不是特别严重的情况下是不需要进行提肌的，但如果像眼下垂比较严重，是可以通过提肌来进行改善，是到正规的医院做一个相关的检查，然后按照医生的医嘱来进行治疗的，因为上眼睑下垂严重的时候，也是会对视力造成一定的影响。

上眼睑有哪些结构

眼睑是眼球的保护膜，他是由上眼睑和下眼睑两个部分组成，上眼睑组织包括9大组成部分，即皮肤、皮下组织、眼轮匝肌、肌下组织、眼眶隔膜、眶内脂肪、上睑提肌、上睑板肌和结膜。皮肤、皮下组织、眼轮匝肌与下眼睑的构成相同，区别在于眼眶隔膜，上睑提肌，和上睑板肌。

1、眼眶隔膜。他是区分眼睑和眼眶的标志，他是连接睑板与眶缘的一薄层结缔组织，眶隔后被眶脂充填。眼眶隔膜的作用是防止眶脂进入眼睑，阻止炎症互相蔓延。眼眶隔膜是单眼皮形成的主要原因，眶隔与上睑提肌融合部位置低于睑板上缘以下，阻挡了上睑提肌纤维穿过，使之不能附着于皮肤，因此形成了单眼皮。

2、上睑提肌。他是由动眼神经支配，起于眶尖部总腱环，呈扇型止于上睑板上缘及前面，部分穿眶隔止于上睑皮肤，有提上睑开大睑裂的作用。

3、上睑板肌。他又被称为米勒氏肌，其为小平滑肌，起于眶隔后，贴附于上睑提肌深面，止于睑板上缘。该肌受交感神经支配。遇惊吓时，该肌收缩，使睑裂增大。麻痹时，上睑呈轻度下垂。

下睑组织结构和层次基本与上睑相同，独没有上睑提肌，睑板与肌肉较上睑薄弱。

眶脂较上睑要多一个，为3个脂肪球。

上眼睑下垂怎么办

以下回答摘自深圳大学总医院整形科白晓东主任《上睑下垂》

请区分是先天性还是后天性的呢？

下面介绍了上睑下垂的定义、分类，尤其以先天性上睑下垂为例，介绍了危害、诊断和治疗分别加以描述，可以参考，希望对你有帮助！

上睑下垂是一种生活中很常见的疾病，会给患者生活造成很大影响。上睑下垂会导致病人眼睛不能睁开，减少视野范围。临床上分先天性和后天性两类。

先天性上睑下垂是上睑下垂中最常见的类型，是由于提上睑肌发育不良，或支配它的运动神经动眼核神经发育异常、功能不全所致。表现为出生后即可发现的单侧或双侧上眼睑下垂而不能上提，常伴有患儿习惯性的皱额、耸肩及仰头视物，轻者影响外观，重者导致弱视，影响视物功能。

怎么确定孩子有这个病呢？首先让孩子双眼睁开平视前方，仔细观察上睑缘覆盖角膜上缘的程度：正常范围覆盖量为1.5-2mm，如果覆盖量为2mm为轻度下垂，3mm为中度下垂，4mm为重度下垂。如果确诊先天性上睑下垂，只有通过手术矫正来治疗，重度上睑下垂必须及早手术矫正，以免对视觉发育造成影响。一般将手术安排在3~5岁进行。

治疗方法：

手术方式一般有两类：1.上睑提肌缩短术:适合于轻度患儿；2.额肌瓣法：适合于所有类型患者，这是一种利用额头肌肉收缩来加强上睑提肌功能的方法。这种手术的优点是只需在上睑皮肤沿重睑皱襞(俗称双眼皮线)处做一小切口，然后经过分离转移额肌瓣完成手术，起到使眼睛睁大的作用，效果可靠持久。手术后需每1~2周复诊，主要观察有无感染和暴露性角膜炎迹象发生。

上睑下垂做手术后能闭合吗？

上睑下垂，就是俗称的“大眼皮”，是由于提上睑肌和平滑肌功能不全或丧失，以致上睑呈现部分或全部下垂，遮盖瞳孔。

有的求美者，或许会选择双眼皮手术来改善眼部下垂，这样行不行呢，咱们看一组

对比图：

上睑下垂是肌肉无力，需要做相应手术矫正的。上睑下垂矫正和双眼皮手术，这两个不是同一个手术，但通常一起做的。

单纯的做双眼皮，术后只是拥有了双眼皮的皱褶，而上睑提肌的力量并没有得到任何的改善调整，你可以看看中间的这张图片，上睑下垂并不能得到有效改善，眼睛看起来依然无神。

这位求美者担心：做上睑下垂矫正手术，担心术后不能闭合的问题。

其实，有一部分人，做完上睑下垂矫正后，会出现“眼睛闭不紧、不同程度地露出眼球”这种现象，求美者也不要太过担心。

正常情况下，一般经过1-3个月，大部分人的这种症状会慢慢改善，直至可以完全闭合。

为什么会出现这种症状呢？

这是由于人为缩短提上睑肌或利用额肌的力量睁闭眼，上眼睑无法放松与下睑缘合拢，一般是中重度上睑下垂矫正后最为明显;矫正过度也会出现这种情况。

出现这种症状怎么改善呢？

术后闭合不全的程度，这要看手术后眼睑提高的程度和时间。

一般术后短时间会比较严重，大约只能闭合二分之一左右，当然上提的越高闭合不全的程度就越严重。

这阶段的护理最重要：

- 1、每天睡觉前必须点大量眼药膏。
- 2、把手术中下睑的一条牵引线，向上提，并用胶布固定在额部，以保护角膜，避免发生角膜炎。
- 3、术后一周拆线时，一般闭合不全就会减轻一些，但仍要在睡觉前多点眼药膏。
- 4、如果闭合不全还比较严重的话，最好用一条胶布把下眼睑向上提起，胶布贴到

额部使睑裂变窄，盖纱布是没有帮助的，因为纱布不能避免泪液挥发。

这样护理一段时间后，逐渐的闭合不全都会减轻。

有些人的眼睛会长期闭合不全，这主要是因为：

上睑下垂矫正手术并没有让提上睑肌的功能恢复，借助其他力量将上睑提起后更无法很好地闭合，一般是矫正过度导致的。

建议：再次手术调整。如果是后期定型后进行修复，会有一些改善。

欲了解更多“上睑下垂矫正”的相关问题，可关注头条号：整形医生祝东升。

先天性上睑下垂原因

先天性上睑下垂多数因为上睑提肌先天薄弱、残缺或其支配脸部的神经细胞先天发育不良而导致上眼睑部分或完全性下垂遮挡瞳孔；先天性上睑下垂必须要通过手术进行矫正，手术矫正后不会因患儿的生长发育而改变矫正效果，如不及时手术会影响患儿正常视功能发育。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的南京上睑提肌多少钱和做上睑提肌手术多少钱大概问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！