

每个人都希望自己能够更加引人注目。对于女性来说，不仅脸部，胸部也是身体曲线的组成部分。如果你的乳头太大，就会导致乳房下垂，进而引发一系列不适。乳头缩小手术是治疗乳头增大的手术。那么北京乳头缩小手术有哪些风险呢？维持时间长吗？

岱湖整形外科将北京乳头缩小手术的风险总结如下。

- 1、乳头麻木：由于乳头内神经较多，感觉比较敏感，如果乳头过度缩小或切除，或者切除过程中神经丢失，就容易出现乳头麻木的情况。
- 2.影响泌乳功能。泌乳时乳管受损或手术期间乳管堵塞可能会影响泌乳功能。
- 3.感染：如发生感染，应立即就医治疗。
- 4.皮脂囊肿：皮脂囊肿常在手术后数月或更长时间出现在切口疤痕附近。
- 5.切口愈合不良：术后切口愈合不良应通过换药治疗。
- 6、乳头坏死：乳头坏死是手术后严重的并发症，一旦出现乳头坏死，一定要及时就医，待坏死边界清楚后医生才可能进行治疗。
- 7.乳头麻木：乳头麻木没有很好的治疗方法，随着时间的推移，一些乳头感觉可能会恢复。
8. 乳头形状不佳：由于手术后乳头形状可能会变差，因此需要反复咨询医生进行术前设计，以改善术后乳头形状。

很多人对乳头缩小手术能持续多久存有疑问。一般来说，乳头缩小手术的效果可以维持很长时间。乳头缩小手术可以缩小并改变乳头的形状，并且术后不会留下明显的疤痕。但根据个人体质、手术方法、手术规格、术后护理等因素，术后效果和维持时间会因患者而异。