

唇腭裂，俗称兔唇或唇裂，是一种常见的口腔颌面部先天畸形。在正常胎儿中，胚胎的一些突起会在5周后逐渐融合在一起形成面部，但如果融合失败，畸形是正常发育所必需的。这种情况可能会发生。其原因尚不完全清楚，但可能与极大影响面部外观的因素有关，包括营养、遗传、感染、内分泌因素等。然而，随着医学的快速进步，通过选择唇裂和腭裂治疗来改善嘴唇，您可以感到重获新生和自信！

如今，唇腭裂整形手术是通过避免嘴唇直接缝合和防止疤痕形成，使上唇高度恢复正常的手术。人中位于中央，上唇两侧对称，上唇游离缘比下唇靠前，由于下唇下部稍向前倾斜，兔唇应及早治疗，患病婴儿10天左右进行上唇粘连手术产后缓解症状。3个月后，您将接受上唇矫正手术，根据唇裂和腭裂矫正的效果，进行腭裂矫正手术。

唇腭裂整形手术非常安全。患有单纯性唇腭裂的婴儿通常可以在3至6个月大时去医院进行唇裂手术，手术通常不会留下明显的痕迹。许多临床试验已经证明唇裂手术是非常安全的。

以上就是关于唇裂、腭裂整形手术的介绍，仅供参考，希望对大家的了解有所帮助。