

唇裂或腭裂的形成会对孩子的容貌造成严重影响，同时也会对孩子的身心健康产生重大影响，对孩子的健康成长产生非常不利的影响。唇裂长期形成？

唇裂的并发症：

- 1.唇腭裂大小不等，大的裂口可到达鼻孔，常伴有鼻翼塌陷。
- 2.唇裂、腭裂影响美观，可能导致吸吮功能障碍、门牙变形突出、门牙牙槽裂等。
- 3、影响母乳吸吮，病儿吸吮乳房时易吸入呼吸道，引起气管炎、肺炎等。
- 4、嘴唇是发音器官之一，唇裂儿童说话时常出现言语不清，影响发音是唇腭裂的并发症之一。
- 5、影响营养吸收，唇裂者无法正常母乳喂养，因此长期患病的孩子可能会出现营养不良和各种营养障碍，严重时危及生命。

唇裂疤痕修复手术的术后护理：

- 1、术后全身麻醉苏醒前，苏醒室必须专心护理，防止呕吐物或血液进入气管造成窒息或吸入性肺炎。从全身麻醉中醒来之前，应让孩子躺下并将头部倾斜至一侧。
- 2.全身麻醉苏醒后6小时即可少量饮水。2-3天后可改喂半流质饲料，6-7天后可喂软质普通饲料，10天后可喂浓稠、软质半流质饲料。你可以给他们喂软食。
- 3.术后可考虑适当给予全身和局部抗生素预防感染，每天清洁手术伤口和口腔。
- 4.唇腭裂疤痕治疗需在5至7天内拆线，唇腭裂手术需在8至10天内拆线，切勿大声喧哗，以免影响术后伤口愈合。