

唇腭裂属于先天性畸形，目前已知唇腭裂的病因大多是遗传性的。那么，唇腭裂的孩子出生后什么时候应该进行唇裂手术，需要进行多少次手术才能有效呢？

唇裂的原因有哪些

唇腭裂，或先天性唇腭裂，是一种多基因遗传病，影响健康夫妇所生第一胎中约4%的患者，而第二胎中，患病率可达10%。近亲结婚的孩子患病率较高。其次，如果孕妇在怀孕初期患有病毒感染、接触辐射、服用精神药物或有害药物，或因营养不良而缺乏维生素D、叶酸、铁、钙等，胎儿可能有先天缺陷，例如唇裂和腭裂。

唇裂修复术的适应人群

1. 如果宝宝健康的话，出生后3个月可以进行修复手术。
2. 2-3岁唇裂矫正手术，矫正唇裂的继发畸形，同时重新定位唇裂肌肉。
- 3.唇腭裂继发畸形术后每两年矫正两次。

除了上文介绍唇腭裂治疗的适宜人群外，需要注意的是，对于24岁的儿童，更重要的是进行言语评估和腭咽闭合测量，并进行必要的腭咽成形术。预期成绩。

唇裂修复并不是一次性手术

很多家长认为唇腭裂问题只需一次手术就可以彻底解决，但这种想法其实是错误的。唇腭裂的治疗是一系列必要的治疗。治疗步骤根据嘴唇和正常言语功能以及每个患者的畸形和严重程度而有所不同。并且由于唇腭裂的畸形随着生长发育而不断变化，因此唇腭裂的手术治疗应遵循序贯治疗的原则。