

对于唇腭裂患者来说，不仅影响美观，还影响正常生活，唇腭裂手术是在唇裂治疗失败或者效果不理想的情况下进行的，失败的患者有很多注意事项。修复干裂的嘴唇。下面详细介绍唇腭裂手术后适合进行畸形矫正手术的人群。唇裂术后畸形修复术的适应人群

- 1、如果孩子出生后3个月身体健康，唇腭裂手术后可以进行畸形矫正手术。
2. 2岁至3岁需要唇裂矫正同时矫正唇裂继发畸形并复位唇裂肌肉的患者。
- 3、唇腭裂继发畸形患者，术后2年多矫正2次。唇裂术后畸形修复术注意事项

- 1.保持手术切口部位清洁，防止流鼻涕污染伤口，并及时清洁。
- 2.手术后为预防感染，请按照医生的指示口服适量抗生素。
- 3、伤口清洁必须在医护人员指导下进行，切勿不慎清洁或损伤伤口。
- 4.手术后，用勺子或滴管喂食，不要吮吸。如果伤口没有感染，切口缝线一般在术后67天即可拆线，如果个别缝线周围有感染迹象，应及时拆线。

1. 畸形严重，单次手术无法完全恢复时。
- 2、病儿年龄太小，唇部精细结构和畸形尚不明显，手术时无法矫正所有畸形。
- 3.因缝线张力过大或感染导致伤口部分裂开；
- 4.手术时畸形并不明显，但随着唇、鼻、上颌骨的不断生长，出现了新的畸形。造成唇裂术后畸形的原因唇腭裂手术后有些情况并没有得到满意的效果，有些情况下还残留着一定的缺陷，称为继发畸形，一般通过唇腭裂手术后的畸形修复手术来矫正。为了提高治疗效果并弥补单次手术的缺点，必须进行两次或多次手术。