

唇腭裂手术时的注意事项有些孩子在子宫内就因某种原因患有唇腭裂。据了解，唇腭裂不仅影响外表，还影响饮食和说话。因此，唇腭裂必须接受矫正手术。

做唇裂修复手术要注意什么？

1.术前必须空腹采血，检查肝功能、抗菌药物耐药性（6个月以下儿童，还可以检查母血）、血常规、尿常规、胸部X线检查。ETC。如果出现问题，应在入院手术前寻求治疗。

2、手术前患儿必须无发热、咳嗽、流鼻涕等上呼吸道感染症状，并努力消除手术的各种副作用。

3、唇裂手术前后，应养成使用勺子或滴管的习惯，避免术后因不适而哭泣。这可能会影响饮食和伤口愈合。

唇裂修复手术术后护理

1. 手术后一周内按照医生的指示服用抗炎药物，以防止伤口感染。

2.术后2周内不要食用辛辣、浓茶、咖啡、烟、酒等刺激性食物。

3.避免压迫手术部位，术后5天内避免面部剧烈运动，避免面部器官变形。

4.吃完饭后，用蒸馏水清洁嘴唇并涂上润唇膏。

5、避免让嘴唇接触不干净、未经消毒的物体，以免感染。

6、结痂后，让其自然脱落，不要用手抠痂，以免留下疤痕或影响美容效果。