

目前，唇腭裂疤痕治疗被认为是改善唇腭裂的有效方法，可以通过切除、直接缝合、植皮、皮瓣移植等方法进行，但无论哪种方法都有注意事项用来。唇腭裂疤痕治疗不容忽视，为了达到理想的唇腭裂疤痕治疗效果，下面我们就来了解一下唇腭裂手术前后的注意事项。

唇腭裂疤痕修复术前注意事项：

1. 手术前，确保您身体健康，没有任何传染病或其他身体炎症，唇腭裂疤痕手术前2周内不要服用含有阿司匹林的药物。小心阿司匹林，因为它会降低血小板的凝血功能。
2. 患有高血压或糖尿病的患者在初诊时必须将自己的病情充分告知医生，以便医生确定手术方案。
3. 唇腭裂疤痕治疗术前不要化妆，避开月经期。

唇裂疤痕修复手术的术后护理：

- 1、术后全身麻醉苏醒前，苏醒室必须专心护理，防止呕吐物或血液进入气管造成窒息或吸入性肺炎。从全身麻醉中醒来之前，应让孩子躺下并将头部倾斜至一侧。
- 2.全身麻醉苏醒后6小时即可少量饮水。2-3天后可改喂半流质饲料，6-7天后可喂软质普通饲料，10天后可喂浓稠、软质半流质饲料。你可以给他们喂软食。
- 3.术后可考虑适当给予全身和局部抗生素预防感染，每天清洁手术伤口和口腔。
- 4.唇腭裂疤痕治疗需在5至7天内拆线，唇腭裂手术需在8至10天内拆线，切勿大声喧哗，以免影响术后伤口愈合。