

嘴唇是面部运动重要的软组织，发挥着言语、吞咽等重要功能，因此术后疤痕不可避免地会生长。考虑到疤痕演变的规律，早期2期恢复和3期手术是不可避免的。因此，治疗继发性唇部畸形通常需要等到患者的面部停止生长。如果继发畸形严重，影响上唇及周围组织的正常发育，应尽快手术治疗。

唇腭裂手术后发生的继发变形大致可分为唇部变形、鼻子变形和上颌变形。唇部畸形包括口红形状异常和白唇形状异常。常见的唇红畸形包括唇红边缘不均匀、唇弓畸形、唇红凹陷等。常见的白唇畸形包括上唇太紧或太松。继发性鼻畸形包括一侧或两侧鼻子凹陷、鼻尖错位、鼻小柱弯曲以及鼻孔过大或过小。上颌畸形主要是由于颌骨发育不良导致中面部凹陷和双侧颊部不对称造成的。唇裂术后畸形的原因 1、施术者缺乏经验，技术性不全，以至手术治疗产生缺陷或不正确在修复设计中，患唇的高度通常比健康唇稍长0.5至1毫米。为了防止手术后疤痕挛缩，将肌肉层、朱红边界和朱红十字正确对齐并缝合。唇腭裂手术是一项棘手、高难度的整形外科手术，整形外科医生必须具备整形外科的基本理论和技术。

2、畸形本身比较严重，在手术中不可能彻底解决这在3级先天性唇裂患者中很常见。鼻根向下移动，导致裂口变得太宽，鼻梁塌陷，鼻小柱变得太短。这些患者很难立即达到康复效果。后期需要进行四次整形手术，包括自体骨移植来重塑牙槽突和鼻小柱，基本上才能彻底矫正畸形。3.唇腭裂术后护理不足导致局部感染，良好的手术只是成功治疗的一部分，佩戴唇弓、正确减压、伤口清洁等细致的术后护理也不容忽视。