

进行腭裂矫正手术时应考虑到婴儿的身体健康状况（无贫血、呼吸道疾病、感染）和腭裂的严重程度。唇裂矫正手术可以帮助宝宝恢复嘴唇和鼻子的正常形状和功能，让他们重拾自信并过上正常的生活。那么唇裂手术的禁忌症有哪些呢？唇腭裂修复手术的基本要求

腭裂手术的基本要求是尽可能恢复唇鼻的正常外观和功能。正常唇鼻的特点是两鼻孔圆形且大小相同，鼻尖和鼻小柱居中，鼻翼不塌陷，上唇等高且对称，红唇丰满，唇珠微凸，嘴唇丰满，点红边缘呈拱背形状。

腭裂手术后，医生会跟踪宝宝的进展情况，并注意宝宝听力、营养、牙齿和情绪的变化。跟踪和测试，包括语言和情感，一直持续到他们到达学校。

另外，如果腭裂修复手术中伤口没有感染，一般在术后6~7天即可拆线。如果个别缝线周围有感染迹象，应立即拆除缝线。如果伤口张力较高，可在术后5至6天拆线，否则需要7至8天。唇腭裂修复后的效果

腭裂矫正可以矫正人中或重建人中，使上唇的形状更接近正常，更有立体感。唇腭裂矫正可以使上唇的形状恢复正常，使上唇的形状变得更立体。更加立体。它与脸部融合得更好。

腭裂修复还可用于矫正患者唇部中心口红不对称和口红过短的情况，使嘴唇更加自然和谐。腭裂矫正后，可以使嘴唇与正常人一样，腭裂患者也能得到良好的治疗和康复。唇裂修复术的禁忌症有哪些

- 1、孩子体重小于5公斤。
- 2、血红蛋白低于10g/100ml。
- 3.白细胞计数高于104/mm³或凝血功能异常。
- 4、宝宝不满10周。
- 5.如果您的孩子患有急性感染、感冒或上呼吸道感染。
- 6.你的孩子患有消化系统疾病。
- 7、面、口、耳、鼻、喉等炎症性疾病。
8. 如果您的扁桃体太大，手术后您的呼吸可能会受到影响。

9. 儿童不能耐受全身麻醉下的手术。

温馨提示：唇腭裂的治疗过程贯穿整个生长发育过程，需要家长和医生的密切配合才能达到理想的治疗效果。