

重唇系统是一种罕见的异常现象。张开嘴时，上唇酸性边缘处出现双层红唇，内外平行，两层由明显的或浅或深的水平凹槽连接。表现为皱纹壁松弛、厚实，上唇系带下垂，相应分为左、右。组织学检查显示，红唇内层由正常粘膜和覆盖着慢性炎症的草莓状粘液腺组成，不含肌纤维。必须与恶性肿瘤、淋巴结循环问题、炎症引起的慢性唇肿胀相鉴别。

唇部整形手术是在局部麻醉下进行的。沿口侧朱红粘膜切开与朱红边缘上下唇弓平行的切口，切除部分粘膜下层和一块含有眼轮匝肌的粘膜。当精心缝合时，红唇的厚度就会恢复到美丽的标准。一般来说，如果嘴唇的情况比较严重，整个嘴唇整形手术需要1个小时左右才能完成。术后肿胀程度可能会有所不同，所以一定要注意嘴唇卫生，注意不要张大嘴。只要防止感染，患者就不必担心手术疤痕。

重唇矫正术后护理(1)伤口暴露法是唇部整形手术中常用的方法，一种方法是覆盖伤口1~2天后暴露，另一种方法是用75%酒精清洗伤口1~2次每天数次并应用抗生素软膏以保持该区域清洁。(2)手术后必须减少嘴唇运动，3天内必须进食流质食物或流质，并常规使用抗生素预防感染。(3)唇部手术后3至6天通常拆线。如果伤口张力较高，手术可能会根据情况推迟2-3天。