

唇裂，俗称兔唇、缺嘴、唇裂，是口腔颌面部常见的先天性畸形。由于唇腭裂会对一个人的形象造成严重的影响，所以寻求美容治疗的唇腭裂患者通常会选择唇腭裂手术，那么什么时候进行唇腭裂手术合适呢？

兔唇矫正手术矫正时间

兔唇裂矫正往往需要多次，一般单侧唇裂矫正的最佳年龄为36个月，双侧唇裂矫正的最佳年龄为612个月，成年后即可进行第二期矫正。即使是在婴儿期或儿童时期错过唇裂矫正机会的成年人也可以进行矫正，当然手术越早越好，但没有严格的期限。

唇裂矫正手术的风险

咂嘴对患者的影响不仅影响面部美观，而且影响发音，造成漏音、鼻音严重、发音不清，严重影响人际交往，造成很大的心理压力。目前常用的兔唇矫正方法有旋转推进法、三角瓣法、矩形瓣法等，其保留的组织较多，矫正后唇形较整齐，且疤痕相对较小。

唇腭裂矫正手术

唇部矫正手术的基本步骤是点设计、切口、皮肤缩小重建、皮肤缝合。在进行唇形矫正手术之前，必须对孩子的身体进行检查，确保孩子身体健康，没有上呼吸道感染，局部及周围组织没有感染，才可以进行唇形矫正手术。兔唇矫正的原则是尽可能保留组织，恢复上唇的正常高度，使上唇以人中为中心两侧对称，同时矫正小柱和鼻小柱的偏差。增加高度。