

唇裂一直是困扰很多人的问题。唇腭裂带来的手术效果、术后恢复以及心理问题都成为生活困境。唇腭裂整形手术是矫正唇腭裂的有效方法，但可以随时进行吗？哪些情况不能进行唇腭裂手术？哪些情况下不能进行唇裂手术1.体重小于5公斤的儿童不适合唇腭裂手术。 2、宝宝不满10周。不建议进行唇裂矫正手术。 3、血红蛋白低于10g/100ml。血红蛋白水平低会影响大脑和身体发育，使手术变得困难。 4.导致面部、口腔、耳朵、鼻子和喉咙周围发炎的疾病。如果患有炎症，此时不宜进行手术，以防止细菌通过血肉进入。

5.如果您的孩子患有急性感染、感冒或上呼吸道感染。不建议进行唇裂矫正手术。

6.你的孩子患有消化系统疾病。不建议进行唇裂矫正手术。唇裂手术术后护理（1）麻醉恢复期一般为术后4~6小时左右。观察孩子呼吸情况：为便于口腔分泌物排出，保持呼吸道通畅，取下枕头，头偏向一侧平躺，血氧饱和度应在95%以上。观察伤口情况：注意手术部位的肿胀情况，如果肿胀严重，呈紫色，说明有明显的血液渗出。嘴上有疮。）

为防止孩子抓伤唇部伤口，必要时可适当限制和约束上肢的活动。

如果有鼻塞，必须密切监测鼻塞情况，防止鼻塞被吸入鼻腔，意外进入气管。（2

）待孩子完全清醒6小时后，即可给予少量饮水，如无咳嗽、呕吐等情况，即可开始配方奶，并指导孩子家属喂食。用于唇裂和腭裂的勺子或专用瓶子。（3）对于宽唇裂患儿或双侧完全唇裂患儿，可采用唇弓固定，减少唇部伤口张力，术后10-15天即可拆除。（4）按照医嘱使用抗生素，并注意孩子服药后的反应。（5）伤口愈合良好，术后5-7天即可拆线。由于婴幼儿不合作，拆线往往在全身麻醉下进行，拆线后密切观察孩子的生命体征，如无异常，醒后4小时即可喂配方奶。

温馨提示：唇腭裂整形专家表示，唇腭裂手术前需要检查所有检查条件是否正确，只有条件良好才能进行手术。