

有些人因为患有先天性唇部畸形而接受手术，而进行唇腭裂矫正手术的原因是一些先天性唇部畸形可能需要多次手术才能完全矫正。由于手术后上唇组织收紧，第二阶段唇腭裂手术变得更加困难。

唇裂术后畸形修复术的适应症1.如果您的孩子出生3个月后身体健康，可以进行唇腭裂矫正手术。 2.

2岁至3岁需要唇裂矫正同时矫正唇裂继发畸形并复位唇裂肌肉的患者。

3、唇腭裂继发畸形患者，术后2年多矫正2次。

唇裂术后畸形修复的时机1. 外国儿童出生后4天内可以接受手术。

2.学龄前，身体还在发育。 3、成年人进入社会，身体发育已经完成。 4、在韩国，术后康复的要求比较高，通常需要1到2次手术，一般认为在成人进入社会之前进行比较合适。

唇裂术后畸形修复术前的注意事项1.保持口腔周围清洁，防止感染，一周内不要食用活血食物或药物。 2、如果感冒流鼻涕，可能会出现伤口感染，这是影响手术效果的重要因素，所以感冒时不宜进行手术。温馨提示：唇腭裂手术后整形时常见的问题有疤痕、不对称、唇色不均匀、前唇短、鼻梁凹陷、鼻子塌陷等。需要进行下一步手术。