

骨质疏松症安全吗？骨成形术有哪些后遗症？大多数人对整形手术有一个误解，认为动作越大，变化就越大。例如，截骨注射和【瘦脸除皱】注射都是去除面部脂肪的手术，但截骨的风险和手术难度都很高，而且用刀的动作也很吵。

【除皱】只有1次注射，针孔大，所以去骨效果比【面部除皱】注射更好吧？

受自身基础条件限制

神经线的高度直接影响截骨空间的大小。下颌骨切除并不是简单地切掉多少骨，而是取决于神经线的位置，神经线越低，切骨量越小，从而增加了切骨的效果。变化不大。

由于骨切除只能在神经线以下进行，所以现在普遍采用长弯曲截骨术，这使得下颌角的弧度更加自然，仅外侧下颌角的轮廓发生变化，而下颌额叶的宽度保持不变不变。漂亮的。

皮质骨的厚度也会影响骨量的减少量，对于下颌角内翻的国人脸型，除了进行轮廓截骨缩小下颌角外，还需要进行皮质截骨术，使脸型变宽。变化比较大，但正如前面提到的，长曲线截骨手术技术不会对脸部正面造成明显的变化。你还需要像这样切割它。拆分外板。

但由于外板的磨削量和劈裂量是由皮质骨的厚度决定的，因此手术分为内颧骨推挤手术和前颧骨缩小手术。颧骨部位采用内颧推骨术，颧骨部位采用前颧骨缩小术。

如果没有选择正确的手术方法

例如，如果直接用单刀切开下颌角，往往会形成次骨，而如果选择了错误的手术方法，软牛脸可能会变成方脸，只能治疗次骨。这种手术方法是不是效果不太好，但它的独特之处还在于，随着年龄的增长，脸部仍保持方正，二次手术会造成面部下垂等副作用。