

唇裂和腭裂是如何发生的？虽然目前还没有定论，但怀孕期间的环境对于胎儿的生长发育仍然非常重要。通过产前检查可以发现唇腭裂，那么唇腭裂治疗的术前准备有哪些呢？

唇裂和腭裂可以通过产前护理发现。

事实上，唇裂和腭裂并没有明确的病因。目前，医学界认为主要原因包括病毒感染、受伤、母亲在怀孕期间服用的某些药物（镇静剂、抗癫痫药、激素等）、母亲的情绪影响以及各种化妆品化学物质。专家提醒孕妇，在孕早期应尽量避免这些不良因素。

如今，产前检查已经发展了很多，所以除非你是唇裂不明确的患者，都可以通过B超来检测出来。目前，唇腭裂基本分为3度：1度是隐性唇裂，仅红唇分离，2度是超出红唇但未到达鼻底的唇腭裂。三度是唇裂和腭裂。程度是指从鼻下到上唇的完全唇腭裂。唇腭裂也分为单侧唇腭裂和双侧唇腭裂，但临床上来说，目前单侧唇腭裂稍多见。

唇腭裂手术前的注意事项：

1.唇腭裂患儿住院后应避免使用奶嘴或吮吸母乳，并应纠正用勺子喂食的吃手指习惯，防止手术后损伤伤口。

2、

配合各种常规检查，包括血常规、凝血功能检查、胸部X光检查、超声心动图和其他检查。此外，应积极预防呼吸道和胃肠道感染，如果孩子发现打喷嚏、咳嗽、流鼻涕、腹泻或发烧等症状，应联系护士或医生，不要自行服药。儿童还应保持口腔周围皮肤清洁，如发现湿疹应推迟手术。

3、手术前必须准备好尿布、冷水、牛奶、果汁、安全别针、无菌棉签、成人丝袜、纸巾等，以供手术当天使用。

4、手术前儿童应禁食68小时，成人禁食12小时左右，进食流质食物后不要过饱，洗澡，修剪手指甲、脚趾甲。手术前一天保持卫生；手术当天，您需要换尿布、摘下所有首饰并重新称重。