

唇裂多见于先天性唇部缺陷。虽然唇裂对人的容貌影响较大，也会影响孩子的说话和咀嚼能力，但也是可以矫正的。许多唇裂儿童可以通过唇裂手术得到矫正。嘴唇比较正常，那么唇部手术后要注意什么？

兔唇修复后的注意事项

- 1.兔唇修复手术后，医生会帮助患者使用钢丝唇带减少张力，保持嘴唇固定两周。这有效地防止伤口重新张开并有助于伤口愈合。
- 2、唇裂手术后，家长要帮助孩子用医用双氧水和硼酸酒精清洁伤口，有效防止血痂影响伤口愈合，从而保证唇裂整形手术的效果。
- 3.唇腭裂治疗后，家长应遵照医生的指示，确保孩子服用适量的口服抗生素，以预防感染。伤口清洁应在医护人员的指导下进行，切勿不慎清洁或损伤伤口。
- 4、兔唇修复手术后，应用勺子喂食，避免吸吮，以减少缝线渗漏和牙槽修复创伤。为了防止您的孩子哭泣，您需要在唇裂手术当天重新开始高能量饮食。限制上半身的动作，避免手指划伤伤口。
- 5、如果伤口没有感染，通常在兔唇修复手术后6-7天即可拆除切口缝线。如果个别缝线周围有感染迹象，唇裂手术畸形修复后应立即拆除缝线。