

严重的唇外翻不仅严重影响美观，还会干扰患者的正常工作和社交活动，甚至造成局部功能障碍，例如下巴、颈部、乳房粘连严重时，下唇变得极度受损，称为外翻，在进食、吞咽、言语和吸气等过程中出现各种程度的功能障碍。疤痕延伸可造成苗状等畸形，常合并表层组织广泛损伤或疤痕肌肉萎缩，甚至骨与颞下颌关节粘连，导致下颌生长发育中枢功能丧失，患者唇部受到影响。喙。它的变化就像状态的变化一样。

阴唇肥大矫正前的准备：术前半个月内不要服用含阿司匹林的药物，患有冠心病或尿毒症的患者应在初诊时告知医生病情，以便医生决定是否进行手术。手术前，确保没有传染病或其他身体感染。4.手术前不需要化妆。5、女性应避开经期。唇外翻畸形的原因：唇外翻最常由面部烧伤、外伤、感染、手术并发症等引起，其中以烧伤疤痕肌肉萎缩引起的唇外翻最为常见。唇外翻畸形造成的弊端：唇外翻伴有嘴角轻微或轻微变形，影响患者美观，干扰社交活动，给患者造成心理压力，造成精神痛苦，影响功能功能。嘴唇。不大。严重的唇脱垂不仅严重影响美观，还会干扰患者的正常工作和社交活动，并可能导致局部功能障碍，例如下巴、颈部、乳房粘连严重的情况下，下颌、嘴唇这可能会突出并出现症状。症状可能包括饮食、吞咽、吞咽、说话和吸气水平的功能障碍。