

兔唇影响其外观和咀嚼功能。成年人的兔唇也能治好吗？嘴唇还会影响发音或者说话风格，久而久之会给人带来很大的心理阴影，所以唇部卷曲的矫正是非常有必要的。那么唇腭裂矫正手术方法是什么呢？步骤是什么？

成人唇裂可以治疗吗？

兔唇裂矫正往往需要多次，一般单侧唇裂矫正的最佳年龄为36个月，双侧唇裂矫正的最佳年龄为612个月，成年后即可进行第二期矫正。即使是在婴儿期或儿童时期错过唇裂矫正机会的成年人也可以进行矫正，当然手术越早越好，但没有严格的期限。

嘴唇的危险

咂嘴对患者的影响不仅影响面部美观，而且影响发音，造成漏音、鼻音严重、发音不清，严重影响人际交往，造成很大的心理压力。目前常用的兔唇矫正方法有旋转推进法、三角瓣法、矩形瓣法等，其保留的组织较多，矫正后唇形较整齐，且疤痕相对较小。

兔唇手术过程一般可分为固定、切开、分离、缝合四个步骤。

1.定点设计。定点设计是指在唇部和鼻子上画出各种手术方法的切口设计，然后用蘸有黑色液体的针沿着设计线的几个关键点刺入皮肤。注意不要刺入太深而导致出血。

2.剪掉它。切开前，可在双上唇靠近嘴角处用唇夹或缝线压迫唇动脉，以减少出血。当然，你也可以用手指捏住唇动脉来达到同样的目的。做切口时，外科医生将左手中指放在切口处的口腔粘膜上，用食指和拇指捏住或收紧嘴唇，以收紧组织，使切口更容易。

3.分离。为了减少伤口闭合的张力，应在牙槽嵴两侧作松弛切口，并对骨膜进行钝性剥离。患侧的脱离程度比健侧更大，包括裂侧脸颊和鼻子的软组织。完全性唇腭裂需要切除鼻外角与下鼻甲的附着点，完全游离外鼻骨，以便更好地复位并确保鼻子两侧对称。

4.缝合。从内向外缝合。先缝合鼻根部，复位鼻翼，然后缝合唇粘膜和眼轮匝肌，实现功能复位。肌肉层不宜缝合过多，尤其是鼻根处一针一线缝合尤为重要。第二次缝合不仅可以达到复位眼轮匝肌的目的，还可以纠正小柱根的错位。同时。