

兔唇是遗传性的。唇裂患者的直系亲属或父系亲属可能会出现类似的畸形，但这种遗传的风险并不高。同时也要考虑到其他容易造成这种情况的因素，比如怀孕期间过度吸烟喝酒，以及使用一些激素或者抗肿瘤药物等。怀孕期间，暴露在阳光下、缺乏环境污染、氧气和其他条件可能会导致基因突变，从而导致嘴唇干裂。

小孩兔唇是怎么形成的？

儿童唇裂的原因大致分为两类。

一是遗传因素：如果父母或亲戚都有唇裂，孩子就更容易出现唇腭裂。

其次，孕早期进行口腔颌面部整形手术可能会使患者受到一些外界影响，如孕早期患有病毒性传染病、长期抑郁、服用可导致胎儿畸形的药物等，导致胚胎发育异常、唇裂等。和味觉。缺乏微量元素和维生素、吸烟及被动吸烟、饮酒等原因。

产检时怎么诊断兔唇？

兔唇又叫唇裂，是指嘴唇不连续，通常通过B超来判断是否是兔唇。怀孕期间，一般建议在第20周和第30周之间进行两次大范围B超检查，如果发现唇上端或下端连续性，则可能怀疑唇裂。您可以通过去医院或拍摄3D图像来诊断嘴唇是否存在。胎儿畸形可以在出生后进行治疗，无需丢弃胎儿。