

先天性唇腭裂是一种先天性发育畸形，一般与遗传因素、基因突变、药物因素、环境因素有关。因此，建议有家族史的夫妇在产前检查时尽早进行筛查。

唇腭裂会遗传给下一代吗？

先天性唇腭裂往往有家族聚集性，如果唇腭裂患者的直系亲属或直系亲属中出现类似畸形，则遗传的可能性很大，患者的子女也可能患有唇裂和腭裂。

如果患者患有唇腭裂，但直系亲属或旁系没有唇腭裂病史，此时最需要考虑的可能是环境因素。下一代的水平会更低，所以不用太担心。

因此，有唇腭裂家族史的孕妇应进行妊娠试验，怀孕期间尽量不要吸烟，避免接触化学物质和辐射，增加胎儿畸形的可能性。如果您的胎儿不幸患有唇腭裂，不必过于担心，只需及时到综合医院就诊，在医生的指导下接受手术治疗即可。

唇腭裂是几个月形成的？

通常，唇裂和腭裂从怀孕第三个月开始逐渐形成。女性怀孕三个月时，体内的维生素B2、维生素A、叶酸会导致胎儿出现唇腭裂，这与遗传和环境因素有关。

如果母亲在怀孕初期感染了风疹等疾病，胎儿可能会出现唇裂和腭裂。怀孕第3到4个月，去医院做4D彩超，检查孩子发育是否正常。