

有些天生唇腭裂的宝宝会去医院做唇腭裂手术，但我们对此了解不多。唇腭裂矫正手术有哪些类型？

唇裂修复术前准备

- 1.由于唇腭裂手术是针对婴幼儿进行的，术前准备工作尤为重要。
2. 手术前，孩子的体重必须增加5公斤以上。
- 3.手术前进行血液检查，红细胞和白细胞水平必须在正常范围内，如果与正常水平有差异，则需要治疗，待血液恢复正常后进行手术。
- 4.孩子的出血和出凝血时间也必须正常。
5. 手术当天，用肥皂水彻底清洗上唇、下唇和鼻子，并用盐水棉签擦拭口腔内部。

唇裂修复种类

- 1、隐唇，隐唇的特征包括超过上唇垂直长度的凹槽或疤痕、红唇上有痕迹、白唇上有缺陷、上唇垂直方向有不同程度的缩短。鼻部畸形可能会发生，有时比嘴唇问题严重得多。通常需要手术治疗，但手术过程中必须小心，避免术后出现比先天畸形更严重的畸形。
- 2.单侧不完全性唇裂单侧不完全性唇裂，上唇裂开的程度各不相同，但共同的特征是鼻根部或西莫纳氏带完好。可以使用旋转推进方法进行修复。虽然鼻变形程度不同，所需的移动和复位程度也不同，但可以与唇裂手术同时进行。
3. 单侧完全性唇裂的特征是上唇、鼻底和肺泡（来自初级腭）有裂痕。完全性腭裂常伴有完全性腭裂，但不一定会发生继发性腭裂。评估单侧完全裂的关键是牙槽的位置和患唇的垂直高度。一般来说，牙槽骨有四个位置：
 - (1)狭窄，不塌陷。
 - (2)狭窄伴塌陷。
 - (3)缝隙较宽，不易塌陷。
 - (4)缝隙较大，并伴有塌陷。

了解更多：婴儿唇裂和腭裂治疗后的注意事项是什么原因导致新生儿唇裂和腭裂？