

唇裂的原因包括遗传因素和环境因素。妊娠测试是预防新生儿唇冻的更好方法。然而，这并不能保证新生儿不会出现脂肪瘤。如果新生儿后期出现并发症或者有唇腭裂，就必须在适当的时候进行唇腭裂治疗，那么唇腭裂手术的手术方法是怎样的呢？

兔唇修复术的步骤：

1.唇部矫正前的治疗。唇腭裂孩子的出生对于父母来说无疑是一个沉重的打击，需要父母更多的爱。医生应该让儿童入组进行长期随访。产科医生和儿科医生对孩子进行全面的身体检查，回答相关问题，提供正确喂养技术的指导，并在整个唇腭裂治疗过程中为孩子的亲属提供预防措施。

2.单侧唇腭裂手术一般在3~6月龄进行，双侧唇腭裂手术通常在6~12月龄进行。

3. 腭裂矫正最常在12 至18 个月大时进行。

4.术后处理。此时腭裂已得到治疗，但孩子的发音可能仍带有较强的鼻音，因此术后6个月内必须检查孩子的发音状况，并进行早期发声训练。二次咽部成形术可在4至5岁左右考虑。此外，患有唇腭裂的儿童通常牙齿不齐，可以接受正畸治疗。

5.治疗颌部和面部的继发性畸形。对于重度唇腭裂患者来说，9~11岁是唇裂植骨治疗的理想年龄。另外，由于鼻唇骨和颌骨现有的继发畸形很难一次性得到满意的矫正，所以必须在孩子生长发育完成后（男性17岁至18岁，15岁）进行二次整形手术。对于女性、年龄较大的人）。