成人唇裂和腭裂可以治疗吗？唇裂、腭裂术后该如何治疗？成人唇裂和腭裂也可以治疗。最好在孩子年幼时治疗唇裂或腭裂。成人唇腭裂的治疗较晚，但比手术要好。根本不需要手术，它仍然有效。对于在婴儿期错过修复黄金机会的成年人来说，孟唇也可以修复，但效果会降低。一般来说，唇裂手术越早进行越好，但没有严格的时间限制。

目前兔唇常用的方法有旋转推进法、三角瓣法、矩形瓣法等，可以保留更多的组织，恢复后唇形整齐，减少疤痕。

唇腭裂修复术后应怎么护理？

- 1.腭裂手术后，建议让孩子弯曲膝盖，侧卧，将头转向一侧或低下头，以利于血液或唾液从口腔中流出。对于肌肉较弱的儿童，舌头可能会向后倾斜并影响呼吸。如有必要，可插入口腔气道并供气。
- 2.术后2-3周内可以进食流质食物，然后改用半流质食物，1个月后可进食普通食物。
- 3、待孩子苏醒后才能拔除气管插管，待孩子完全苏醒后可喂少量糖水4小时，观察30分钟。你可以喂你的孩子。
- 4.为防止伤口感染，每天清洁口腔，鼓励患者喝水，并定期服用抗生素，持续3至5天。
- 5.为防止手术后伤口张开，严禁儿童大声哭泣或将手指或玩具放入口中。
- 6、如果孩子哭声嘶哑，说明喉部有问题，应适时接受激素治疗，并密切监测呼吸。