唇腭裂又称唇腭裂，是我国较为严重的唇部畸形，有的病例还伴有鼻子的一些畸形，而这些畸形在新生儿出生后就有明显的症状。嘴唇为什么会干裂？婴儿唇裂的治疗方法是什么？

婴儿兔唇形成原因：

1、用药不当：孕期各种药物的副作用是造成胎儿畸形的重要因素，现已证实孕早期服用抗癫痫药物、孕期摄入大量维生素A可引起先天性唇裂。

2、不良习惯：怀孕期间吸烟、饮酒或喝含酒精的饮料也可能对某些胎儿造成无辜伤害。

婴儿兔唇治疗方法：

1、纯唇腭裂的宝宝一般在3~4个月时就去看整形医生矫正唇腭裂，此时手术效果较好。

2.同时，如果有腭裂，可能需要进行一些修复手术，以方便宝宝以后的喂养和正确的言语。由于唇裂或腭裂的形状和严重程度不同，因此必须根据具体情况决定手术时机。

如果只是唇腭裂，则需要手术缝合腭裂，如果唇腭裂累及上唇，则需要对腭裂进行治疗。唇裂修复后，通常不会留下明显的痕迹，但进食通常不再受到影响。医生建议，腭裂儿童在6个月至1

1/2岁之间时进行腭裂修复更为有效，这可能有助于孩子将来重新获得言语能力。

一般来说，根据唇部冷冻的严重程度，治疗方法和恢复次数也有所不同，而且唇部冷冻的治疗需要循序渐进的过程，基本上不可能一次性成功恢复。为了孩子的心理健康，唇腭裂最好不要拖延治疗，建议唇腭裂孩子的家长尽快带孩子去面诊医生尽可能。