

大家都知道唇腭裂对患者的生活和心理都有严重的影响，但并不是所有唇腭裂患者都可以进行唇腭裂整形手术，而且对个体要求比较高。那么唇腭裂整形手术有哪些症状呢？下面我们就一起来了解一下吧！

唇腭裂整形手术注意事项有哪些？

由于接受手术的儿童的吸吮行为会增加上唇的紧张和过度活跃，从而影响伤口愈合，因此建议儿童在手术前改变饮食习惯，使用勺子代替哺乳母亲。伤口感染是影响手术效果的重要因素，因此孩子感冒时不宜进行手术。关心。为防止流鼻涕污染伤口，唇腭裂整形术后的儿童应给予适量抗生素预防感染，并在医护人员指导下清洁伤口。

唇腭裂整形手术的适应症状有哪些？

如果宝宝出生后3个月左右身体健康，就可以进行唇裂矫正手术，对于2-3岁的孩子，唇裂矫正可以矫正唇裂的继发畸形，同时重置唇裂肌肉的位置。嘴唇继发畸形每两年矫正两次，由于先天性嘴唇本身属于胚胎发育畸形，涉及皮肤、肌肉、粘膜、骨骼、软骨等畸形，这些复杂的畸形是无法矫正的。婴儿期接受过一次手术后有可能复发。

唇腭裂整形根据部位和程度可分为3度：1度唇裂：不完全唇腭裂，仅嘴唇裂开，2度唇裂：不完全唇腭裂，超过红唇但未到达鼻底，3度唇裂：从红唇到鼻底的整个唇裂称为完全性唇裂。

唇腭裂有什么危害？

唇裂和腭裂是口腔颌面部常见的先天性异常，平均每700个婴儿中就有1个出生时患有唇裂或腭裂。唇腭裂不仅严重影响面部美观，而且由于口腔和鼻腔相通，直接影响生长，常引起上呼吸道感染和中耳炎。孩子无法吸奶会导致明显的营养不良，给孩子和家长带来严重的心理创伤。