

唇裂专家王国民医生介绍说：“唇裂是我们俗称的‘唇裂’疾病，是一种常见的口腔颌面部先天性畸形。平均每700个婴儿中就有一个出生时患有唇裂。”唇裂。“味觉。下唇如何分类？只有针对类型才能得到更好的治疗。在我国，常用的分类方法是单侧唇裂，一级：红唇唇裂。二度唇腭裂：上唇部分裂开，但鼻子下方的区域保持完整。III度唇裂：从整个上唇一直到鼻底的完全裂口。

双侧唇裂按照单侧唇裂分类方法分为双侧唇裂，包括双侧三度唇裂、双侧二度唇裂、混合性左三度唇裂、右二度唇裂。ETC。国内外尚无统一的腭裂分类方法，根据硬腭、软腭骨层、粘膜层、肌肉层裂口的程度和部位，临床上有以下几种分类方法。常用：(1)仅腭裂软腭裂，有时仅局限于腭叶。无论左、右，一般不伴有唇腭裂，临床上多发生于女性。(2)不完全性腭裂又称部分性腭裂。软腭完全裂开伴有硬腭部分裂开，有时一侧唇裂不完全，但牙槽突通常是完整的。在这种类型中，没有左、右之分。(3)单侧完全性腭裂是指从腭裂到切孔处有完全裂开，然后斜向外延伸，触及牙槽突，与牙槽裂相连。健侧裂口边缘一侧与鼻中隔和肺泡相连，裂口有时会消失。仅保留一条裂口，有时非常宽，并且常伴有同侧唇裂。(4)双侧完全性腭裂常与双侧唇裂同时发生，上颌裂向两侧斜裂，直达牙槽突，中央分离鼻中隔、前颌突、前阴唇。除上述类型外，还可见几种非典型情况，如一完整一不完整、腭叶缺损、粘膜下裂（隐裂）、硬腭部分裂等。此外，国内一些机构普遍采用腭裂分级方法，将腭裂分为1度、2度、3度。国际上常用的分类：1、单侧唇腭裂、单侧不完全性唇腭裂（腭裂未开裂至鼻底）、单侧完全性唇腭裂（整个上唇完全裂至底部）2、双侧唇裂、双侧不完全唇腭裂（双侧唇裂在鼻以下不裂）

双侧完全性唇裂（双上唇在鼻以下完全裂）

双侧混合性唇裂（一侧完全裂）一侧不完整）先天性唇腭裂唇腭裂的产前诊断目前先天性唇腭裂的产前诊断主要依靠超声检查。胎儿唇腭检查应在26至28周时进行，此时羊水充足，活动能力较好。目前，利用3D超声表面模式诊断胎儿唇腭裂畸形的周期为20至34周。