

耳廓小于正常的人患有小耳症，通常伴有外耳和中耳畸形。耳垂畸形包括耳垂缺失、耳垂过大、耳垂粘连、耳垂裂等。副耳是位于耳屏前方的耳廓状结构，部分可能会移至脸颊或颈部，并可能伴有腭裂异常和牙齿发育减退。上述所有畸形都可以通过整形手术来治疗。

全耳廓再造术适用于：

- 1.先天性心脏发育不良引起的小耳症。
- 2.因外伤、肿瘤切除、感染等原因导致耳廓丧失。
- 3.双侧小耳畸形和外耳道闭锁的患者，应首先考虑耳廓成形术和鼓室成形术，然后再进行耳廓成形术。
4. 如果存在小耳畸形、小颌畸形，建议先进行下颌延长手术，然后进行耳廓重建手术。
- 5、耳廓再造手术的适宜年龄为15岁左右。

在做全耳廓再造手术前，我们要注意以下事项：

1. 测量未损伤耳廓的大小和位置，提前准备好耳廓形状的胶片，并消毒，手术时使用。如果患者有耳廓畸形，应根据父母的正常耳廓进行拍片。
2. 全身麻醉前的准备工作如常。
- 3.向患者或家长解释手术方法、需要多少步骤、每个步骤的目的以及所需时间。

全耳廓再造术的禁忌症：

年老体弱者不宜手术，可佩戴假耳，手术部位皮肤有毛囊炎、疖肿等急性炎症病变，应待炎症消退后再行手术。