

唇外翻矫正术术前准备。厚唇厚唇需要从口腔中去除一块唇粘膜。对于薄唇来说，可以去除上唇边缘周围的一条皮肤，使红唇变得更加饱满，同时还能打造出明显起伏的唇弓。明显突出的唇珠可能需要使用局部红唇组织进行重建。此外，鼻子下方和嘴唇之间的皮肤过度拉长（医学上称为白唇）也可以通过手术矫正。唇部手术后的肿胀会在短时间内恢复很快，一般不会影响饮食或日常生活。

“V--Y”推进皮瓣法唇外翻矫正手术：这种唇外翻矫正手术适用于轻度唇外翻。为了使唇外翻手术在治疗过程中获得理想的效果，在进行唇外翻矫正手术之前首先要检查嘴唇周围的组织是否柔软并可以滑动。唇外翻矫正手术“Z”整形术：唇外翻矫正手术适用于上下唇线状疤痕收缩引起的外翻畸形。唇外翻矫正手术时，可根据Z形整形原理进行唇外翻手术，去除疤痕，矫正外翻畸形。唇外翻矫正手术后，由于疤痕位于鼻唇沟或下唇下自然皱襞处，所以不易被看见。唇外翻矫正术前准备：术前2周内不要服用含阿司匹林的药物，高血压、糖尿病患者初诊时必须告知医生，以便确定手术方案，术前检查是否有传染性疾

病或其他身体炎症4.手术前不要化妆。5、女性应避开经期。唇外翻矫正术后注意事项：术后限制下颌活动，不要张大嘴，通过管饲提供流质食物，保持孩子舒适，防止过度哭泣，以免患处伤口裂开。2 由于手术部位的伤口每天大约有75%的时间可能暴露，因此使用酒精和3% 过氧化氢保持面部清洁，并做好口腔护理。3. 术后5至7天拆除面部皮肤缝线。口腔粘膜可能会自行脱落。