

目前，小耳畸形的主要治疗方法是耳廓再造术，而主要的耳廓再造手术大致分为两类：一类是扩张器耳廓再造术（半包覆、全包覆），另一类是非扩张手术如布伦特再造术。和永田重建。一次性成型法（也称为直接投资法）。

非扩张法分为Brent法、Nagata法和一次成型法。

1.布伦特耳再造手术分为三个阶段。第一次手术是从胸部取出肋骨软骨，插入耳朵支架，并将其埋入耳后皮下，患者需要住院7天左右，第二次手术则需要一个月左右。之后，将再造的耳朵提升成立体形状，耳垂移位，并在耳后区域植皮，住院时间约为10天，第三次手术需要3至6个月的时间。重建的耳朵进行了部分修剪，耳廓加深，住院时间约为7天。

2.永田的耳朵再造手术分为两个阶段，是布伦特法的改良版。手术的第一阶段，首先从胸部采集肋软骨并雕刻成耳朵支架，剩余的耳朵软骨被去除，将支架埋入乳突瓣皮下，此阶段进行耳垂转位及耳廓成形术，36个月后通过二次手术重建颞耳角。耳后置入肋软骨提升支架，覆盖颞筋膜，并将皮肤移植到耳后受伤部位。

3、一次性整形术，又称直埋法，与布伦特法、永田法不同，一次性整形术适用于耳后乳突区皮肤较多的小耳症患者。要求患侧皮肤弹性好，发际线高，另一侧健耳不大，颞耳角度不高。手术是一步式手术，从胸部取出肋软骨，雕刻成耳支架，然后将乳突区域的皮瓣提起，用皮瓣覆盖耳支架的前部。这是一种在耳后用筋膜瓣覆盖支架并在其上移植皮肤的手术，这样，重建耳朵的形状就完成了。未来6个月内可以进行另一次耳朵重建手术至1年，视患者情况而定。这样做是为了完全重建耳朵。

非扩张法的优点是不需要埋置皮肤扩张器，手术周期较短，一期即有大体的耳廓形态。

缺点是：

- 1.重建后的耳朵显得肿胀。
- 2.耳后需要额外植皮。
- 3、再造耳朵的高度不好。
- 4.再造的耳朵较厚。
- 5、再造耳朵表面毛发较多。

非扩张法主要适用于患侧耳后乳突区皮肤较多、皮肤弹性较好、发际线较高的小耳症患者。