

唇系带附着在中切牙之间的唇牙龈和牙槽粘膜的交界处。唇系带在胎儿时期相当厚，因此大多数婴儿在出生后会逐渐收缩。如果它不收缩并且在牙龈之间附着得太低，可能会导致上门牙之间的间隙变得过宽。

唇系带整形术是一种矫正唇系带短的婴儿的方法，主要是通过手术切除唇系带，防止日后因唇系带过短而出现发音问题。

阴唇系带整形术的手术方法和步骤

- 1.局部浸润麻醉。
2. 打开嘴唇并使用镊子或持针器固定系带两端的底座连接点。
- 3.沿系带两侧（粘膜侧、牙槽骨侧）作V形切口至骨膜浅层，轻者可作V-Y形缝合，重者可作Z形缝合可能的。可以进行整形手术来扩大系带。
4. 去除所有系带组织，将唇内侧粘膜上的伤口面向牙槽骨一侧的伤口，形成菱形伤口。
5. 修剪伤口边缘周围的粘膜。
6. 粘膜对齐后，垂直直线缝合。
- 7.唇粘膜侧张力较低，伤口容易闭合，而牙槽骨侧由于附着牙龈固定，张力较高，因此存在缝线拉不完全的情况。如果骨膜暴露，用碘仿纱布或无菌箔覆盖，并使用牙周塞保护伤口。

标记

- 1.唇系带太短。
2. 唇系带安装得太低。
- 3、唇系带收缩不良；
- 4.影响义齿修复。

忌讳

- 1.有伤体质的人
- 2.有凝血障碍者
- 3.患有严重高血压、糖尿病、心脏病等的人。
- 4.全身感染或手术部位局部感染的患者。

手术前的注意事项

- 1.手术前不要化妆。
- 2、女性应避免经期。
3. 手术前，请确保您的身体健康，没有传染病或其他身体感染。
- 4.阿司匹林会降低血小板的凝血功能，因此术前2周内不要服用含有阿司匹林的药物。
5. 患有高血压或糖尿病的申请人必须在第一次咨询时告知医生详细的病情，以便代为确定计划。