

乳晕缩小手术失败了，可以修复吗？乳晕缩小手术是如何进行的？乳晕是乳头周围皮肤的深色圆形区域。乳晕的正常直径约为3至6厘米，如果乳晕过大且不美观，可以通过乳晕缩小手术来改善外观。

乳晕缩小手术失败了可以修复吗？

乳晕缩小手术失败是可以矫正的，乳房整形手术有失败恢复手术。如果乳晕缩小手术失败，可以进行需要神经纤维修复和血管修复的二次修复手术。

不过缝合手术要等乳房恢复后才能进行，所以建议选择大型综合医院，并做好术后护理。

乳晕缩小手术怎么做？

乳晕缩小手术是在确定正常乳晕周长后，利用设计的切口线将圆周以外的乳晕切除的手术，乳晕缩小手术一般称为双环乳晕缩小手术。

乳晕缩小手术后，内乳晕环和原来的外乳晕环被缝合，这不可避免地导致外环发生一定程度的折叠，从而使乳晕环的位置形成相应的多重折叠，就像发髻皱纹一样。包子折叠的类型，半年内可以自行伸展。如有缺陷，半年后必须修补，调整至局部形状。

乳晕的正常直径约为3厘米，超过3厘米的部分可以通过手术切除。如果皮肤褶皱少，则没有效果，如果较多，一般在术后半年进行修复调整。外科手术。