

唇系带附着在阴唇和中切牙之间的牙槽粘膜的交界处。唇裂在试管婴儿期间比较牢固，所以大多数婴儿在出生后会逐渐收缩，如果不收缩，牙龈之间的粘合力太弱，上牙之间的间隙就会变得太宽。这种情况可以通过唇部瘻管切除术来改善。

选择的手术方法包括在鼻中隔软骨和肌肉的底部制作蝴蝶形伤口。因此，术后伤口疤痕非常模糊，看不清楚。彻底矫正变形的鼻肋软骨、弯曲的鼻中隔、发育不全的上颌骨等鼻支撑结构，同时根据实际情况进行了上唇和鼻部皮下组织的部分整形手术，从而使鼻桥鼻梁坚挺，鼻梁匀称，方便术后恢复，双鼻孔对称，上唇结构丰满。唇系带切除术后怎么护理？1. 多吃有营养的食物，有利于手术后的恢复，避免吃太热的食物，因为它们会刺激伤口。

2、术后47小时，如伤口干燥无分泌物，用流水轻轻清洗，半个月后洗澡。3.术后第一至第三天需要冷敷。用塑料薄膜包裹冰块，然后裹上一层棉毛巾绕过伤口，进行冷敷。手术后76

小时应使用热敷。它有助于减少炎症、激活血液循环和去除血栓。