

婴儿唇裂可以通过手术治疗，治疗后的效果也比较好。要治疗唇裂或腭裂，必须首先去专科或综合医院并咨询有经验的医生。让医生监测您孩子的病情并制定适合您孩子的治疗计划会更安全。修复后定期检查。

唇腭裂对宝宝的身体健康影响是比较大的，所以如果宝宝出现了唇腭裂，就需要进行修复手术，一般情况下唇裂是需要缝合的，所以建议带宝宝去医院就诊。综合医院进行手术。你需要给宝宝补充营养。您的宝宝应该接受心理咨询。如果您的宝宝发现他或她的嘴唇表现不稳定，您应该尽快转移他或她的注意力。

按照目前的医疗标准，唇裂和腭裂是可以治疗的。胎儿唇裂的原因有营养不良、环境因素、遗传因素等。如果您的胎儿嘴唇干裂，请不要灰心。唇裂和腭裂可以在出生后进行治疗。按照医生的指导和用药，孩子康复后的生活不会受到影响。

新生儿兔唇修复手术的时机：

一般来说，新生儿出生后3~6个月进行吸脂手术比较安全。新生儿上唇组织较薄，使得身体对外界的抵抗力较弱。手术过程中的休克反应比较严重，手术过程中的麻醉问题也增加了手术的难度。

目前，国内外多数人认为，新生儿唇腭裂手术应在婴儿36个月大时进行，此时婴儿相对稳定。有些患者需要进行第二次手术。您的医生会根据新生儿唇裂和腭裂的具体情况来计划具体的手术。经过多年来的多次临床手术证明，在这个年龄段进行手术，术后恢复较快，术后残留的疤痕在几个月内逐渐减少。有些患病的孩子已经三四岁了，或者来幼儿园做手术。此时，唇部组织逐渐开始萎缩，使牙列和牙槽突畸形的矫正变得更加困难。