

大虎整形外科曾经认为，樱桃色的唇、小巧、性感、诱人的唇形是万千女孩的梦想。如今，对美丽嘴唇的追求不再是排他性的，厚嘴唇更受欢迎，因为厚嘴唇看起来很性感。有的情况是唇形从出生起就不理想或者后来就受到了损伤，这种情况可以通过唇部整形手术来矫正，所以不用太担心，今天就给大家讲讲唇部除皱手术的知识。

什么是唇系带？

上唇系带：位于上唇内表面中线的细绳状结构，从上唇延伸至牙龈下方。位于口腔上前庭，中切牙之间，牙龈与粘膜交界处，是眼轮匝肌通过扇形或带状粘膜附着于上颌骨的部分。折叠。

唇系带异常迹象

唇系带附着太低（也称为短唇系带）。有些人的唇系带太短，导致嘴上扬；有些人的唇系带太低，导致牙齿之间产生间隙；有些人的唇系带太低，有些人的唇系带太低，有些人的唇系带太低，导致牙齿之间产生间隙。人们有唇系带是因为它太低了。会影响矫正效果。

进行唇系带切除术前需要做什么准备？

1.术前必须空腹采血，检查肝功能、抗菌药物耐药性（6个月以下儿童，还可以检查母血）、血常规、尿常规、胸部X线检查。

ETC。如果出现问题，应在入院手术前寻求治疗。

2.患者术前必须无发热、咳嗽、流鼻涕等上呼吸道感染症状，并努力消除手术的各种副作用。

3.唇腭裂修复手术前，儿童必须习惯用勺子或滴管进食。这样可以防止手术后因不适而哭泣影响进食和伤口愈合。

阴唇系带切除术后注意事项

1. 吃有利于术后恢复的营养食物，避免太热的食物，因为它们会刺激伤口。

2、术后48小时伤口干燥无渗液，2周后用水轻轻冲洗并洗澡。

3. 手术后1至3天需要冰袋。用塑料薄膜包裹冰块，并用毛巾包裹以避免切口，然后敷上冰袋。手术后72小时内需要热敷。这可能有助于减轻肿胀、刺激血液循环和清

除血栓。

通常缝合后一周内就会生长得很好。如果排列良好，它就会生长得很好。该部分具有较好的恢复能力。虽然拆线后可能不太好，但慢慢就会恢复得很好。因此，唇系带切除后就不会再长出来。