

1、嘴角歪对一个人的整体脸型影响很大，嘴角歪应该如何治疗呢？治疗口腔下垂的方法主要有两种，第一种是V-Y推进皮瓣法，适用于唇部组织缺损不明显、口腔轻度拱形的患者。使用这种方法时，为了术后取得更好的效果，首先要检查嘴唇周围的组织是否柔软、滑滑。V形切口是根据倾斜状态设计的，V形切口的位置、角度和臂长根据嘴的倾斜位置、方向和角度而变化。2.第二种是Z形整形术，适用于因疤痕牵引导致一侧口腔向上或向下移位，或一侧口腔下垂的患者。例如，如果嘴角向上扭曲，请患者张开和闭上嘴，观察嘴角的正常位置。然后设计Z形切口，根据倾斜程度插入组织瓣的臂长和角度。

注意上唇切口沿嘴角至中线的长度，将其下方的三角形皮瓣插入此切口的间隙，以减少嘴角的弯曲。嘴角的正常高度。形成的三角形瓣的底边应朝外，底边的高度应等于嘴角向上倾斜的向下距离。根据设计，将皮肤切开至眼轮匝肌，将皮瓣提起并插入上唇切口，然后停止缝合。注意事项口角矫正手术的方法必须综合考虑疤痕挛缩的原因、部位、方向、程度，口周围口红组织的健全程度，口角周围软组织的柔软程度来确定。如果局部疤痕广泛，无法进行V-Y角成形术或Z角成形术，则应考虑植皮或远端皮瓣移植。