

自体脂肪丰下巴是一种常见的整形手术，通过注射自体脂肪来改善下巴形状，美化面部轮廓。虽然这种手术在临床上应用广泛，但也存在潜在的风险。

1. 感染：如果手术过程中操作不当或术后护理不充分，可能会发生感染。一旦感染，可能会出现红、肿、痛等症状，需要立即治疗。
2. 脂肪吸收不平衡：自体脂肪隆下巴后的脂肪吸收率因人而异。如果脂肪吸收不均匀，手术后下巴的外观可能会不理想，这种情况下再填充脂肪就会很困难，效果也不会理想。
3. 脂肪瘤：注射过多的脂肪会引起脂肪瘤。脂肪瘤是良性肿瘤，通常需要手术。
4. 皮肤碎裂：一些美容爱好者可能会注意到手术后局部皮肤碎裂。这是正常现象，通常不需要特殊处理。
5. 瘀斑、红肿、水肿：注射部位可能会出现红肿、瘀斑，一般3天左右就会自行消失，如果不消失，应及时就医。

自我隆下巴手术可以维持的时间可能因个人体质、手术效果和术后护理而有所不同。一般来说，它可以持续几个月到几年。通过适当的术后护理，您的结果可能会持续更长时间。

因此，在选择手术时，一定要选择正规的医疗机构和经验丰富的医生，以保证手术的安全性和有效性。