

上唇过短时：上唇过短的原因可能是上唇生长过短，在进行前唇延长手术矫正时，双唇峰部过于向内倾斜，眼轮匝肌受到影响。没有恢复。如果生长短，可以用Milla rd修复，如果眼轮匝肌无法修复，可以通过在前牙设计倒V形皮瓣来修复。 2 上唇过长时：主要症状是整个上唇过长或上唇两侧过长，这种情况发生在前唇和手术十字唇瓣一起使用进行双边矫正时。可以通过矫正唇裂、整个上唇过长或者上唇两侧稍长来矫正。 3、上唇太紧：矫正相对困难的原因是唇部机构严重不发达，或者用前唇原长法或加法法矫正时，唇顶点位于外侧，或者唇部机构太紧。已移除很多内容。

上唇过长美容术的护理管理1.

手术后如有出血或出现严重脓肿，必须立即到医院就诊。 2.

必须严格遵照医生指示，按时按量服药和就诊。 3.如果过度使用，则进行整形手术

。上唇长手术后10天内注意手术部位不要接触水4、手术部位必须清洁、环境卫生，防止感染。如果伤口上有结痂或其他杂物，可以用无菌生理盐水清洗。 5. 手术当天伤口部位会有疼痛感，但随着时间的推移这种情况会逐渐改变。阿司匹林药物会加重伤口出血，所以受术者无需急于服用止痛药。