

对于太长的上唇，通过去除嘴唇与鼻子底部交界处上方的全层上唇组织条，将上唇向上缩短。有些人认为，应该通过将上唇下方的皮肤和肌肉（红唇和白唇交汇处）切割成猩红色的弓形来缩短上唇。

由于我国不少青少年有疤痕体质，切除后容易留下明显的疤痕，所以如非必要，均应采用上述方法。比较安全的手术方法是切除猩红边缘（表面有细皱纹的部分）与口腔粘膜（光滑表面）交接处的口腔粘膜和肌肉，将上唇向上缩短，缝合。直接到伤口处。这将确保切口疤痕不暴露。如果上唇太长，海外专家建议切除上唇上方的全层上唇组织，即嘴唇与鼻子底部相交的区域。向上缩短上唇。有些人认为，应该通过将上唇下方的皮肤和肌肉（红唇和白唇交汇处）切割成猩红色的弓形来缩短上唇。韩国年轻人多为疤痕体质，切除后容易留下明显的疤痕，所以除非绝对必要，否则不宜采用上述方法。比较安全的手术方法是切除猩红边缘（表面有细皱纹的部分）与口腔粘膜（光滑表面）交接处的口腔粘膜和肌肉，将上唇向上缩短，缝合。直接到伤口处。这将确保切口疤痕不暴露。