

根据螺旋缺陷的严重程度，它会给一些患者带来心理阴影。对生活中的孩子表现出过度的关爱。这会导致一些孩子变得占主导地位并被宠坏。因此，应尽早进行耳廓再造手术。那么耳廓再造术的注意事项有哪些呢？耳廓再造的注意事项有哪些

- 1、剥离耳廓皮肤表面时，皮下层不能太薄，充气取出胶囊后，必须注意皮瓣的血液供应，必须注意保证果皮不太薄。太深，无法防止损伤运行异常的面神经。
- 2、塑形时所用的锚定缝线应交替进行，不可太紧，以免皮瓣坏死。
- 3.组织扩张法不建议快速扩张，防止手术后扩张袋暴露和Y板回缩，可能导致耳廓畸形和过度扩张。理想的是术前扩张的皮瓣在维持一定时间后完全不收缩。
- 4、如果耳廓支架裸露，必须立即处理。小病例可以通过局部换药来治疗，而大病例可能需要用皮瓣覆盖。由同种异体、异质或人造材料制成的支架应谨慎使用，因为它们可能会暴露并导致手术失败。耳廓再造的术前准备

1. 有病史，评估整体身体状况。
- 2.耳部检查。
- 3.有或无出血倾向的药物应用。
4. 确定有效的耳部手术方法和设计。
- 5、拍照并根据情况制定各种手术方案。
- 6.术前一周停止饮酒和吸烟。
- 7、女朋友应该避开月经。耳廓再造的术后护理

- (1)抗生素定期静脉注射，连续35天。
- (2)术后三天取出橡胶引流条，挤出腔内积血，继续加压包扎。
- (3)术后第7天拆线。
- (4)从术后第10天开始，每隔36天向扩张器内注入57ml生理盐水1次，注射过程中注意皮肤肿胀程度和颜色。当皮色变白时，停止注射，观察15分钟，当皮瓣颜色恢复正常时，说明注射水量合适。如果皮瓣颜色不恢复，则说明注射了过多的水，应

从注射口排出部分液体，以防止皮瓣坏死。

(5)60ral-tj'扩张器可过度充气至100ml，当注水量达到100ml时，停止注射，维持扩张器36个月，然后取出扩张器，进行耳廓成形术。执行。履行。

温馨提示：这种耳廓再造手术深受大家好评，因为它使用的是患者自身的软组织，所以手术后的感觉真实，不会出现排斥反应或其他现象。