

耳廓重建需要薄皮剥除吗？有些人患有耳廓畸形，有些人无法像其他人一样在耳朵上佩戴漂亮的耳环。耳廓畸形可能是先天性的，也可能是后天性的，可以通过耳廓重建来改变。

耳廓再造需要剥离薄层皮

去除耳廓皮肤表面时，必须保持较薄的皮下层，不能太薄，扩张后去除囊膜时，必须注意皮瓣的血液供应，并注意避免剥离。太深了。如果耳廓支架裸露，应立即治疗。小病例可以通过局部换药来治疗，但较大病例可能需要用皮瓣覆盖。由同种异体、异种和人造材料制成的支架应谨慎使用，因为它们可能导致手术失败。塑形时使用的锚定缝合线应间隔一定距离且不能太紧。

组织扩张法不主张快速扩张，是为了防止术后扩张袋外露，造成Y瓣收缩，造成耳廓畸形。襟翼它不会收缩。手术治疗是比较理想的。

耳廓重建手术分两个阶段进行。首先将皮肤扩张器埋入耳区皮肤下，扩张皮肤，1~2个月后置入支架，完成耳部重建。用于耳重建的耳廓和耳垂。该方法可以有效解决耳廓再造时耳后乳突区皮肤不足的问题，扩张后的皮肤很薄，因此再造耳朵的轮廓清晰，形状也比较真实。

耳托的材质有两种选择，一种是用自己的肋骨软骨制成，优点是不会引起排斥反应，安全性高。第二种是进口合成支架，优点是不需要去除软骨，可以直接植入。

耳廓再造不会造成耳朵畸形

进行耳廓再造或全耳廓再造的患者有先天性小耳畸形和外伤性耳廓缺损两种类型，采用这种方法可以有效改善耳廓畸形。随着整形技术的进步，耳廓再造手术已经非常成熟，在一般整形医院进行耳廓再造一般不会有任何副作用。耳朵再造不会导致耳朵畸形。

我们在选择医院和医生时需要谨慎，因为在设备较差、经验不足的非正规医院进行手术，更容易导致耳朵畸形、不对称、耳朵感染、红肿，从而对手术造成很大影响。