

您听说过乳房畸形矫正手术吗？那么什么样的情况才算乳房畸形呢？乳房畸形是乳房发育的先天性异常。常见的包括多指症、乳房不对称、波兰综合症、圆柱形乳房、男性乳房发育症和次生乳房，也称为男性乳房发育症。下面简单介绍一下一些常见症状：

1.副乳，或称先天性多乳，多为双侧。一个或多个婴儿形状的乳房可能出现在正常乳房的上方或下方，并且还可能有乳头和乳晕。成年后，月经前可能会出现明显的肿胀，哺乳期间也可能分泌乳汁。治疗丰胸的方法可以是切除乳头和乳房组织、吸脂、或吸脂与切除相结合，视情况而定。

2.乳房不对称，其原因尚不清楚，其特点是两侧乳房发育不均匀，大小、形状存在差异，可通过隆胸、乳房缩小、乳房下垂矫正、胸廓畸形矫正等方法进行矫正。

3.波兰综合征：指先天性单侧胸大肌、胸小肌、乳房、乳头、乳晕发育不全或缺失，常合并手、臂畸形，尤其是手部手指短、并指。波兰综合症的乳房整形手术根据胸大肌和胸小肌的丧失程度而有所不同，在某些情况下，会进行乳房再造手术，通过用不同尺寸的硅胶植入物填充受影响的区域来扩大乳房。这是平衡的。当因胸大肌、胸小肌严重缺损而难以满意地重建胸壁和乳房时，通常采用带蒂移动背阔肌扩大乳房，然后再重建胸大肌的方法。肌肉，可以获得满意的效果。女性患者术后也能取得满意的效果，可以像普通人一样自信地穿泳衣参加社交活动。

4、乳腺畸形造成的桶形乳房这是乳腺基底部过于狭窄，导致乳房变成桶形的现象。这些畸形可以通过在手术期间操纵乳房来矫正。

乳房增大的原因是什么？

乳房膨胀的原因分为先天性和后天性，先天性是天生的，后天性乳房膨胀主要是由于以下原因。

1、内衣不合适：过大的内衣不能给乳房提供支撑，而且随着身体的移动容易出现下垂或凸出的情况。压迫导致乳房组织从内衣两侧被推出，造成外部肿胀。

2、运动时没有穿着合适的运动胸罩：运动时，身体的活动幅度增大，乳房也会随之移动，如果没有穿着合适的内衣，乳房在运动时就得不到强有力的支撑。身体运动时，会出现下垂、外扩的现象。

3、减肥：减肥后，原有乳房区域的脂肪减少，皮肤变得松弛，托起和支撑乳房的力量不足，可能会导致乳房下垂、肿胀。

4、哺乳后：孕妇和哺乳期妇女分泌较多的雌激素，使乳房丰满，罩杯增大一号，但停止哺乳后，乳汁消退，雌激素分泌减少。减少，乳房内的脂肪组织减少，全部减少，导致乳房扩张。

当然，如果你或你的闺蜜对隆胸或整形手术有顾虑或需要，最好去综合整容医院接受治疗。