

乳房再造手术为因乳腺癌而失去乳房的女性带来了希望，但理论上，任何因乳腺癌而切除乳房的女性都可以接受乳房再造手术。外科手术。主要表现为乳房再造的并发症。下面，我们就为您介绍一下乳房再造手术的并发症。

手术过程中可能出现的问题包括出血、积液、术后疤痕、麻醉意外等，虽然发生率很低，但确实会发生。与任何手术一样，吸烟会影响愈合，留下明显的疤痕并延长恢复时间。这些并发症有时很严重，需要再次手术。

如果您有乳房植入物，则手术后一到两周有可能发生感染，有时需要取出植入物并等待几个月，待感染完全控制后再重新植入另一个植入物。

乳房假体植入后常见的并发症是所谓的“包膜挛缩”，这是一种假体周围的疤痕或包膜开始收紧、乳房变硬的现象。包膜挛缩的治疗包括通过手术去除植入物周围的疤痕组织并移除或更换植入物。

乳房再造手术后的护理：

- 1.乳房再造术后应持续负压引流48小时，并用加压绷带覆盖手术伤口。
2. 乳房再造术后12小时内，患者保持仰卧位，待硬膜外麻醉药效消失后改为半卧位。限制您的活动以减少出血或疼痛。
- 3.每小时静脉注射1500-200ml，静脉注射抗生素5-7天。
- 4、乳房再造术后48小时，打开敷料，拔除引流管，观察皮瓣或肌皮瓣的颜色变化，若出现紫红色，应立即进行相应的治疗和管理。
- 5、乳房再造手术后3-4天可能会出现38.5以下的发烧，这多为吸收性发热，可采用退热药或物理降温疗法来治疗症状。但如果5天后出现高烧，必须及时检查治疗，考虑是否存在感染，然后改用有效的抗生素。
- 6.乳房再造缝线一般可在术后7天间歇性拆除，术后8-10天应拆除全部缝线。为了使乳房固定和塑形，术后3个月内必须佩戴有弹力的胸罩，这样可以减少切口区域的张力，防止再造乳房下垂和变形。

女性乳房再造术后需要一段适应期，而手术的成败很大程度上取决于患者的心态和主治医生的技术，所以术前需要受术者有正确的心态，同时也需要做好手术的准备。选择手术。医院、正规整形医院和熟练的整形医生