用自体乳房组织重建的乳房持久且具有逼真的外观。如果神经吻合与皮瓣移植同时进行，重建乳房的感觉一般可以在术后一年左右恢复。

自体组织法乳房再造术的过程如下：

皮瓣设计：根据乳房缺损设计供皮瓣区域的皮肤表面积和形状，一般皮瓣长度为10-12cm，宽度为18-20cm。

皮瓣切口：沿设计线切开皮肤及皮下组织，露出肌肉组织，然后将供区的肌肉钝性分离，然后按照设计切开含有血管和皮下脂肪组织的肌瓣。该设计。

皮瓣移植：根据设计，切除治疗区疤痕，分离皮肤，将切除的肌皮瓣移至胸部，将肌皮瓣的血管与胸腔内相应血管吻合。胸腔。如果成功，皮瓣的形状就完成了。这是正确制作的。

缝合：受区创面边缘可用游离肌瓣缝合，供区缺损可直接牵拉缝合，或移植其他区皮瓣游离缝合。乳头和乳晕的缺损以及乳头和乳晕的重建可以在术后3至6个月内进行。

在胸部和供体部位放置引流管，并用适当的加压绷带包扎。

适应症人群和禁忌人群：

适应人群

因乳腺肿瘤切除乳房后乳房完全消失的病例

因烧伤、外伤、感染或先天性乳房发育不良等原因造成乳房缺陷者。

禁忌人群

患有重要脏器疾病或全身性疾病不能手术的人。

有凝血功能障碍的人。

有肿瘤复发或转移迹象者。

患有精神疾病或情绪不稳定的人。