

先天性乳房畸形如何矫正？乳房发育是很多女性都关心的问题，有些情况下在发育过程中会出现先天性乳房缺陷，那么乳房有哪些缺陷，哪些缺陷可以通过隆胸来矫正呢？

常见的乳房发育畸形包括继发性乳房（多指畸形）、乳房不对称、波兰综合征、圆柱形乳房和男性乳房发育症。

1、丰胸：丰胸是先天性多发乳房，多为双侧。一个或多个婴儿形状的乳房可能出现在正常乳房的上方或下方，并且还可能有乳头和乳晕。成年后，月经前可能会出现明显的肿胀，哺乳期间也可能会分泌乳汁。治疗丰胸的方法可以是切除乳头和乳房组织、吸脂、或吸脂与切除相结合，视情况而定。

2.乳房不对称：乳房不对称的原因尚不清楚，其特点是两侧乳房发育不均匀，大小、形状存在差异。可以通过隆胸、缩胸、乳房下垂、胸廓畸形矫正等方法进行矫正。

3、波兰氏综合症：波兰氏综合症是指先天性单侧胸大肌、胸小肌、乳房、乳头、乳晕发育不全或缺失，常伴有手、臂畸形，尤其是占有。波兰综合症的乳房整形手术根据胸大肌和胸小肌的丧失程度而有所不同，在某些情况下，会进行乳房再造手术，通过用不同尺寸的硅胶植入物填充受影响的区域来扩大乳房。这是平衡的。对于因胸大肌和胸小肌严重丧失而难以满意地重建胸壁和乳房的情况，可采用带蒂背阔肌移植来增大乳房，并常利用背阔肌重建胸大肌。手术后，女性患者将能够像普通人一样自信地穿着泳衣、参加社交活动。

4、桶形乳房：这是由于乳腺畸形造成的，乳腺基部太窄，导致乳房变成桶形。这些畸形可以通过在手术期间操纵乳房来矫正。