

通常，为了诊断特定的疾病，临床医生需要根据临床医学影像或相关检查结果或患者的主诉和医生的临床观察来提供相应的诊断依据。那么哪些类型的乳房畸形才算畸形，常见的乳房畸形有哪些呢？如何修复它？

首先你要了解什么是乳房畸形，乳房畸形是一种先天性的乳房发育异常。常见的包括多指症、乳房不对称、波兰综合症、圆柱形乳房、男性乳房发育症和次生乳房，也称为男性乳房发育症。下面简单介绍一下一些常见症状：

1.副乳，或称先天性多乳，多为双侧。一个或多个婴儿形状的乳房可能出现在正常乳房的上方或下方，并且还可能有乳头和乳晕。成年后，月经前可能会出现明显的肿胀，哺乳期间也可能会分泌乳汁。治疗丰胸的方法可以是切除乳头和乳房组织、吸脂、或吸脂与切除相结合，视情况而定。

2.乳房不对称，其原因尚不清楚，其特点是两侧乳房发育不均匀，大小、形状存在差异，可通过隆胸、乳房缩小、乳房下垂矫正、胸廓畸形矫正等方法进行矫正。

3.波兰综合征：指先天性单侧胸大肌、胸小肌、乳房、乳头、乳晕发育不全或缺失，常合并手、臂畸形，尤其是手部手指短、并指。波兰综合症的乳房整形手术根据胸大肌和胸小肌的丧失程度而有所不同，在某些情况下，会进行乳房再造手术，通过用不同尺寸的硅胶植入物填充受影响的区域来扩大乳房。这是平衡的。当因胸大肌、胸小肌严重缺损而难以满意地重建胸壁和乳房时，通常采用带蒂移动背阔肌扩大乳房，然后再重建胸大肌的方法。肌肉，可以获得满意的效果。女性患者术后也能取得满意的效果，可以像普通人一样自信地穿泳衣参加社交活动。

4、乳腺畸形造成的桶形乳房这是乳腺基底部过于狭窄，导致乳房变成桶形的现象。这些畸形可以通过在手术期间操纵乳房来矫正。

当然，如果你或你的闺蜜对隆胸或整形手术有顾虑或需要，最好去综合整容医院接受治疗。