

乳房下垂不仅严重影响身体外观，还给乳房健康带来隐患。矫正上睑下垂可以帮助纠正这些问题。那么，乳房下垂矫正手术安全吗？如需了解更多信息，请参阅以下信息，了解它如何影响乳房下垂矫正的安全性。

这对乳房下垂矫正的安全性有何影响？

乳房下垂矫正手术的风险自然可以降低到很低的水平，这取决于美容师是否选择专业、正规的整形医院。正规的整形医院设备齐全，有技术精湛的专科医生，有整形手术和消毒措施，所以可以从根本上降低手术感染的可能性，从各个方面严格控制手术的风险。另外，乳房下垂矫正术后一般需要3个月左右的时间基本恢复，术后完全恢复则需要半年左右的时间。在此期间，接受者应接受适当的术后护理。这是因为乳房下垂矫正手术后，由于术后护理不充分，可能会出现手术风险。

乳房下垂矫正手术的术后护理：

- 1、乳房下垂矫正当天卧床休息，第二天即可外出。
- 2.乳房下垂矫正术后2周内应避免夫妻性行为。
- 3、矫正乳房下垂后，仰卧睡觉，避免睡觉时压迫乳房。
4. 乳房下垂矫正后，您需要佩戴支撑胸罩数周，直至乳房肿胀和瘀斑消失。
- 5、乳房下垂矫正后，不要抬起上肢，必要时可以在乳房上部用绷带包扎。